

parce subtiliter punctato, testaceo, callis lateribusque piceis, vel piceo, strictura apicali, macula discoidali media limboque basali flaventibus; scutello crebre subtilissime transversim striguloso, piceo, lateribus apiceque pallide flavo-testaceis; hemielytris pallide flavo-testaceis, clavo dimidio basali apiceque commissurae, corio margine exteriori maculaque magna apicali, cuneo angulo interiore apiceque piceis; membrana cum areolis et venis picea, utrinque macula magna laterali flavente; areola majore feminae ad partem hyalina; pedibus cum coxis, basi harum excepta, pallide flaventibus, femoribus intermediis annulis obsoletis antepicalibus picescentibus, posticis dimidio apicali piceis, annulo antepicali ipsoque apice pallidis, tibiis anticis muticis, concoloribus, posterioribus spinulis piceis e punctis distinctis piceis nascentibus, tarsis apice articuli ultimi piceo; corpore inferne piceo ( $\sigma^7$ ) vel ventre, apice vittaque laterali exceptis, sordide flavente.  $\sigma^7$  ♀. Long.  $4\frac{1}{3}$ — $4\frac{1}{2}$ , lat.  $1\frac{3}{5}$ — $1\frac{3}{4}$  mm.

Orizaba, m. Februarii, tria specimina.

*L. kalmi* (Linn.) similis et affinis, rostro antennisque paullo longioribus, oculis paullo minoribus, pronoto subtilius et parce punctato, spinulis tibiaram posteriorum e punctis distinctis nascentibus divergens. Caput subverticale, ab antico visum latitudine verticis oculique unici vix longius, a latere visum altitudine multo brevius, clypeo a fronte leviter prominulo, angulo faciali acutiusculo, genis mediocribus ( $\sigma^7$ ) vel sat humilibus ( $\sigma^7$ ), gula obliqua peristomio dimidio brevior; vertice oculo circiter  $\frac{1}{4}$  ( $\sigma^7$ ) vel fere duplo ( $\sigma^7$ ) latiore. Antennae articulo secundo margine basali pronoti parum ( $\sigma^7$ ) vel paullo ( $\sigma^7$ ) brevior. Pronotum latitudine basali circiter  $\frac{3}{7}$  brevius, versus apicem levissime declive, callis sat elevatis, medio antice confluentibus. Scutellum pronoto paullo brevius, leviter convexum. Hemielytra abdomen sat longe superantia.

*Lygus pratensis* L. Per plura specimina hujus speciei varietatumque ejus diversarum.

*Lygus scutellatus* Dist.

Orizaba, mm. Maji et Junii, Cornu Vacca.

*Lygus cristatus* Dist.

Nonnulla specimina.

*Lygus (Paralygus) championi* Dist.

Orizaba, d. 5 Maji.

*Lygus (Paralygus) plagifer* n. sp. Virescens, rostro apicem coxarum intermediarum attingente, articulo secundo antennarum margine basali pronoti  $\frac{1}{4}$  ( $\sigma^7$ ) vel fere magis quam  $\frac{1}{3}$  ( $\sigma^7$ ) brevior, apice late nigro, ultimis nigro-fuscis; femoribus annulis duobus antepicalibus, tibiis apice tarsisque apice articuli ultimi nigro-piceis, tibiis piceo-spinulosis, spinulis e punctis distinctis nigro-piceis nascentibus, tarsis posticis articulo secundo primo vix longiore; vertice aequaliter marginato, oculo paullo angustiore ( $\sigma^7$ ) vel hoc paullo latiore ( $\sigma^7$ ) utrinque ad oculum ante marginem carinatum striola fuscescente notato; fronte ( $\sigma^7$ ) fuscescente, clypeo feminae piceo; pronoto disco parce subtiliter punctato, margine anteriore pone stricturam piceo-nigro, marginibus lateralibus feminae tenuiter fuscis; scutello medio vel vittis duabus appropinquatis mediis, sutura clavi, clavo margine scutellari commissuraque anguste, corio pone medium vitta obliqua introrsum vergente maculaque rotundata ad angulum exteriorem apicalem, cuneo dimidio interiore, vena cubitali excepta, limboque interiore usque ad apicem nigro- vel nigricanti-piceis; membrana fumata, areolis maculaque magna ante medium limbi exterioris