

Corpus elongatum. Caput basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustius, a supero visum pentagonale, leviter transversum, pronoto longitudine subaequale, pone oculos in collum oculo fere duplo brevius constrictum, lateribus pone oculos retrorsum convergentibus; vertice oculo vix duplo latiore; a latere visum altitudine paullulum brevius, fronte fortiter declivi, convexiuscula, clypeo angusto, angulo faciali acuto, loris discretis, angustis, genis mediocribus, gula obliqua peristomio fere aequae longa. Oculi nigri, laeviusculi, mox pone medium laterum capitis positi, a basi ejus sat remoti, orbita interiore subparalleli, leviter late sinuati. Rostrum coxas posticas superans, articulo primo basin capitis attingente, secundo tertio sat multo et quarto paullo brevior. Antennae mox infra medium orbitae interioris oculorum insertae. Pronotum basi longitudine fere duplo latius, versus apicem leviter declive, planiusculum, strictura apicali destitutum, callis bene discretis, sat magnis, angulis posticis oblique truncatis, margine basali recto, lateribus mox ante angulis posticos leviter sinuatis. Hemelytra longius albido-pubescentia. Alae areola hamo destituta. Xyphus prosterni marginatus. Coxae anticae medium mesosterni attingentes. Pedes longi, graciles, tibiis submuticis, tarsis posticis articulo primo brevi, secundo tertio longiore, unguiculis minutis.

Ilnacora malina Uhl.

Cornu Vacca, m. Septembris.

Orthotylus euchloris n. sp. Elongatus, superne smaragdinus, capite, apice pronoti basi que scutelli post mortem pallescentibus; membrana fumata, areolis pallidis, venis smaragdinis; antennis dilute fuscescenti-testaceis, articulo primo pallide virescenti-flavente, capite ab antico viso paullulum brevior, secundo margine basali pronoti distincte longior; pedibus pallide flavo-virentibus, apice tibiaram tarsisque dilute fuscescentibus, tibiis spinulis fusco-testaceis, tarsis articulo ultimo nigro-fusco; capite (♀) ab antico viso vix transverso, vertice postice distincte marginato, oculo circiter $\frac{2}{3}$ latiore, clypeo retrorsum vergente, basi alte posito; rostro coxas posticas attingente; pronoto marginibus lateralibus acutis, medio reflexis. ♀. Long. $6\frac{1}{4}$, lat. $1\frac{2}{3}$ mm.

Mexico, unica femina.

Species lateribus pronoti acutis, medio distincte reflexis insignis. Caput basi pronoti dimidio angustius, a latere visum altitudini aequae longum, apice ac basi fere aequae altum, fronte versus apicem levissime declivi, clypeo fortiter prominente, a latere viso sat lato, basi altissime posita, angulo faciali subrecto, loris sat discretis, genis sat altis, gula sat brevi, subhorizontali. Oculi fusci, in lateribus capitis oblique positi. Rostrum articulis omnibus elongatis, articulo primo medium xyphi prosterni attingente, duobus ultimis simul sumtis secundo distincte longioribus, ad articulationem haud dilatatis. Antennae (♀) ad apicem oculorum interne insertae, articulo secundo primo circiter triplo longiore. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevius, lateribus subrectis apice rotundatis, disco versus apicem leviter declivi, transversim levissime convexiusculo, callis bene determinatis, breviusculis. Tibiae spinulis sat longis.

Ceratopsus punctulatus (Reut.) Reut., Bemerk. nearkt. Caps., Acta Soc. Sc. Fenn., XXXVI. — *Trichia punctulata* Reut., Öfv. Vet. Ak. Handl., 1875, Nr. 9, p. 81. Cornu Vacca.

Ceratopsus castaneus n. sp. Obscure castaneus, superne dense sat longe cervino-pubescentis, pilis semierectis destitutus, nitidus, pronoto scutelloque subtilissime, hemelytris sat subtiliter punctulatis; antennis nigro-piceis, extrema basi articuli secundi testacea; femoribus cum coxis rufo-castaneis vel obscure subsanguineis, tibiis tarsisque