

fusco- vel nigricanti-castaneis; antennis articulo secundo (σ^7) latitudini capitis aequae longo, quarto tertio paullo brevior. σ^7 . Long. $3\frac{2}{3}$, lat. $1\frac{2}{5}$ mm.

Guadalupe, 1 σ^7 .

C. punctulato (Reut.) affinis, sed multo obscurior, superne cervino-pubescentis, antennis paullo brevioribus, pronoto scutelloque subtilius punctulatis. Corpus maris oblongum. Caput (σ^7) basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustius, verticale, a supero visum pronoto $\frac{1}{3}$ brevius et longitudine sua duplo latius, ab antico visum latitudini verticis oculique unici aequae longum, vertice tenuiter marginato, oculo aequae lato, fronte inter oculos perpendiculari, plana, sulco medio longitudinali instructa; a latere visum altitudine brevius, clypeo prominulo, perpendiculari, angulo faciali recto, gula haud distinguenda. Oculi rufo-ferruginei, maris maximi, granulati, genas totas occupantes et in gulam extensi, orbita interiore infra medium profunde emarginati. Antennae (σ^7) inferne in sinu oculorum insertae, articulo primo apicem clypei attingente, secundo margine basali pronoti $\frac{2}{5}$ brevior, versus apicem sensim sat leviter incrassato, duobus ultimis simul sumtis secundo aequae longis, elongato-subfusiformibus, apici secundi aequae crassis. Pronotum basi longitudine duplo latius, lateribus rectis, apice longitudine distincte angustiore. Scutellum basi detectum. Hemielytra maris parallela, abdomen longissime superantia, membrana nigricante, vivaciter iridescente. Tibiae submuticae.

Jornandes (?) intermedius Dist.

Orizaba, m. Februarii; Puebla.

Var. *pallidipennis* n.: Inferne nigra, superne lurido-testacea, oculis et pronoto scutelloque nigris.

Cornu Vacca, m. Januarii.

Var. *scutellaris* n.: Inferne nigra, superne lurido-testacea, oculis, scutello, corio apice anguloque basali membranae nigricantibus.

Orizaba.

Species a Do. Distant, Biol. Centr.-Amer., Rhynch. Het., I, p. 447—449, descriptae certissime ad genus proprium ab illo ejusdem nominis l. c., p. 301 descripto longe divergentem, pertinere videntur.

Div. Plagiognatharia m.

Nyctella lunulifera n. sp. Nigra, opaca, laevis; margine apicali corii externe, fascia interiore cunei obliqua cum illo angulum formante apiceque cunei albis; rostro, articulo primo excepto, apice extremo femorum, tibiis tarsisque pallide flaventibus, apice tibiarum et tarsorum fusco. σ^7 . Long. $2\frac{1}{3}$, lat. $\frac{4}{5}$ mm.

Pueblo, 1 sp.

N. moerenti Reut. (Caps. Venez. in Öfv. Finska Vet. Soc. Förh., XLVII, Nr. 20, p. 37) simillima, signatura cunei divergens, tibiis tarsisque pallidioribus. Caput vertice maris oculo parvo circiter triplo latiore. Rostrum coxas posticas attingens.¹⁾ Antennae articulo primo nigro (reliqui desunt). Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevius. Hemielytra membrana nigricante. Tibiae anteriores punctis destitutae (posticae desunt).

Psallus minutulus n. sp. Nigricanti-piceus vel piceo-niger, nitidus, pilis sat brevibus albidis facile divellendis dense pubescens; antennis ♀ articulis duobus primis

¹⁾ L. c. rostrum false descripti. Lege: Rostrum coxas posticas attingens, articulo primo basin coxarum anticarum paullo superante, duobus ultimis simul sumtis secundo magis quam duplo longioribus.