

121. **Atractotomus morio** J. SAHLB.  
Ist eine nordische und östliche Art, von welcher bisher nur sehr wenige Exemplare gefunden worden sind, nämlich ein Männchen in einem Walde von *Picea excelsa* in Finnland (Jaakimvaara, J. SAHLBERG, 17), ein Männchen in West-Sibirien (REUTER, 67).
122. **Atractotomus parvulus** REUT.  
In den Vogesen von PUTON entdeckt, kommt auch in Böhmen auf *Picea excelsa* vor (DUDA, 3).
123. **Atractotomus brevicornis** REUT.  
In Algier entdeckt, ist von HANDLIRSCH Anfang Juli in Dalmatien auf *Pinus halepensis* zahlreich gefangen worden (REUTER, 114).
124. **Atractotomus oculus** KIRSCHB.  
Das Typusexemplar war in Baden auf jungen *Pinus silvestris* Ende Juni gefangen worden (KIRSCHBAUM, 1).
125. **Atractotomus magnicornis** FALL.  
Bis an die Grenze der mediterranischen Unterregion weit verbreitet, Larven und Imagines ausschliesslich auf Coniferen und zwar vorzüglich auf *Picea excelsa* lebend. Er ist jedoch auf den ungarischen Karpaten auch auf *Abies alba* (HORVÁTH, in litt.) und ferner auf *Pinus silvestris* in Dänemark (SCHÖDTE, 1), England (Sussex, nicht selten, BUTLER, 5, Suffolk, MORLEY, 4), Westfalen (WESTHOFF, 2), Schlesien (ASSMANN) und Thüringen (KELLNER, 1), wie auf *Larix europaea* in England, Croydon (SAUNDERS, 15, BUTLER, 2) gefunden worden.
126. **Psallus kolenatii** FLOR.  
Eine seltene Art, in Livland in Morästen auf *Salix*, *Betula* und *Picea excelsa* gefunden (FLOR 1). Auf den Karpaten kommt sie im Juli und August auf *Picea excelsa* vor (HORVÁTH, in litt.).
127. **Psallus betuleti** FALL.  
Über den grössten Teil Europas auf *Betula*, *Alnus* u. s. w. verbreitet, wird von ASSMANN (1) als auf Nadelholz in Schlesien und auch von KALTENBACH (1) als auf *Pinus*-arten lebend angegeben. Vielleicht sind die Determinationen aber falsch.
128. **Psallus ambiguus** FALL.  
Typisch auf *Alnus*, *Pyrus* u. s. w. im Sommer lebend und weit verbreitet, soll von NICKERL (1) in Böhmen im sächsisch-böhmischen Erzgebirge alljährlich im Juli stets von *Picea excelsa* abgeklopft worden sein; ich habe ein Exemplar gesehen und die richtige Bestimmung kontrolliert. Dr NICKERL schreibt mir, dass er die Art hier stets nur auf Fichten, zugleich mit *Charagochilus Gyllenhalii*, jedoch mehrere Jahre hinter einander nur Imagines gefunden hat, während er sie bei Neuhütten von Schlehen abgeklopft hat. Auch HORVÁTH hat sie im Juni auf *Picea excelsa* in den ungarischen Karpaten gesammelt.
129. **Psallus chrysoptilus** REUT.  
Erst in Ungarn entdeckt, später in Rumänien von MONTANDON (in litt.) auf *Larix europaea* gefunden.
130. **Psallus obscurellus** FALL. (*pityophilus* FLOR, *Meyeri* FIEB., *pini* D. et Sc.).  
Im nördlichen und mittleren Europa verbreitet, kommt überall (Larven und Imagines) nur auf *Pinus silvestris* vor; nur im westlichen Frankreich ist er auch von *Juniperus communis* abgeklopft worden (REIBER et PUTON, 1). MORLEY (4) hat diese Art in England (Suffolk) auf *Populus tremula*, sicher ganz zufälliger Weise, gefunden (die Determination nicht kontrolliert).