

## Div. Capsaria.

## Phytocoris pallidus Berg.

Pallide sulphureus, sat longe flavo-pubescentis; strictura apicali pronoti utrinque punctis duobus lateralibus fuscis notata, scutello lineis duabus longitudinalibus percurrentibus mediis tenuibus parallelis fuscescentibus, his vittam tenuem pallidam includentibus, membrana hyalina, venis pallide sulphureis, versus apicem griseo-irrorata; ventre seriatim fuscescenti-maculato; femoribus posticis versus apicem dilute fuscescenti-conspureatis, tibiis innotatis, pallido-spinulosis; antennis colore corporis, articulo primo pronoto paullulum longiore, robusto et secundo fere duplo crassiore, longe pubescente sed setis rigidis destituto, secundo primo duplo longiore; capite a latere viso altitudini basali fere aequo longo, clypeo usque a basi in angulum rectum prominente, basi ejus alte, fere in  $\frac{1}{5}$  basali altitudinis a latere visae posita. ♂. Long.  $5\frac{1}{3}$ , lat.  $1\frac{2}{3}$  mm.

*Resthenia pallida* Berg, Hem. Arg., p. 291. — *Phytocoris? pallidus* Berg, Add. et Emend. Hem. Arg., p. 70.

Plura specimina legit D. Jensen-Haarup (Mus. Helsingfors).

Caput basi pronoti circiter  $\frac{2}{5}$  angustius, a supero visum pronoto parum brevius, ab antico visum latitudine verticis oculique unici parum longius, clypeo retrorsum vergente; vertice oculo paullulum magis quam dimidio latiore (♀). Oculi fusco-nigri, granulati, a supero visi suborbiculares (♀). Rostrum apicem coxarum posticarum attingens. Antennae articulo secundo margine basali pronoti circiter  $\frac{3}{7}$  longiore. Tibiae spinulis concoloribus, tenuissimis, setiformibus, crassitie tibiae sat multo longioribus.

## Garganus flavovarius n. sp.

Piceo-niger, tenuiter flavicanti-pubescentis, nitidulus; pronoto vitta media discoidali maculaque utrinque pone callos transversali, marginem lateralem attingente, scutello, basi excepta, clavo vix tertia parte apicali, corio commissura, mar-