

minusve distincta, interdum deficiente, pronoto strictura apicali, limbis lateralibus antice ad callos vittaque tenui mediana discoidali, saepe postice abbreviata, scutello parte apicali; angulis basalibus exceptis, corio macula apicali in marginem exteriorem oblique producta, macula laterali segmenti ultimi abdominis, nec non meso- et metapleuris saturate aurantiacis, his saepe disco late nigris. Long. $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$, lat. 2 mm.

Resthenia multifarior Berg, Hem. Arg., 1879, p. 292, 377.

Resthenia (Resthenia) multifaria Berg, Add. et Emend. Hem. Arg., 1891—1892, p. 80, 99.

Argentina, D. Berg (Coll. Signoret).

Caput vertice oculo fere duplo latiore. Antennae articulo primo capite ab antico viso circiter $\frac{1}{3}$ brevior, secundo primo vix duplo longior et margini basali pronoti aequo longo, tertio secundo circiter $\frac{1}{3}$ brevior, quarto tertio iterum $\frac{1}{3}$ brevior. Membrana nigricans. Alae albedo-hyalinae, vivaciter iridescentes.

Div. Cyllocoraria.

Hyperhinocoris nov. gen.

Corpus oblongum (σ) vel ovale (φ), nitidum, laeve, toto facile divellendo dense vestitum; capite fortiter nutante, pronoto angustiore, ante oculos angulato, vertice striis duabus obliquis antrorsum vergentibus impressis, maris angusto, feminae modice lato; capite ab antico viso sat fortiter (φ) vel valde (σ) transverso, fronte cum basi clypei confluyente, basi clypei apicem capituli formante; capite a latere viso altitudine brevior, clypeo toto usque a basi retrorsum vergente, late compresso, parallelo, margine ejus antico marginem inferiorem capituli formante, angulo basali clypei recto, gula brevi, erecta, genis angustis (σ) vel mediocribus (φ); oculis exsertis, modice granulatis, orbita interiore sinuatis, maris maximis, valde convexis; rostro sat gracili, apicem coxarum anticarum paullo superante, articulis secundo et tertio aequo longis, quarto tertio nonnihil brevior; antennis ad apicem