

tenuiter pallide testaceo, membrana cum areola albedo-pellucida, venis nigricantibus; antennis nigris; rostro pedibusque testaceis; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{6}$ angustiore, vertice oculo circiter triplo latiore; oculis exsertis, retrorsum parum vergentibus; antennis articulo primo capite ab antico viso circiter $\frac{2}{5}$ brevior, latitudine verticis oculique unici aeqve longó; pronoto latitudine basali circiter $\frac{1}{4}$ brevior, callis fortiter convexis, disco postice plano, crebre subtiliter punctulato, lateribus sinuatis. ♀. Long. $4\frac{3}{4}$, lat. $1\frac{3}{4}$ mm.

Winchester, Mts, Ariz. d. 20 maji 1897 in *Agave Palmeri* coll. D. HUBBARD, commun. D. O. HEIDEMANN.

A *C. puncticollis* BERGR. corpore majore, capite angustiore, antennis longioribus et gracilioribus, callis pronoti fortius elevatis discoque ejus postico subtilius punctulato, capite piceo-signato scutelloque testaceo divergens.

BERGROTH hat (Wien. Ent-Zeit. XVII, 1898, p. 34) das Pronotum der Gattung *Caulatops* unrichtig beschrieben. Die schiefen (nicht transversellen), hinten in der Mitte fast zusammenstossenden Calli begrenzen ein quer dreieckiges, punktiertes Apikal-feld, das nach vorne jede Striktur entbehrt.

Cyrtocapsus intermedius n. sp.

Nigricans, pubescentia alba in maculas collocata, marginibus lateralibus capitis ab antico visi gulaque testaceis; capite pronotoque nitidulis, hoc leviter in fuscum vergente, unicolori; hemielytris opacis, nigricantibus, embolio crasso cuneoque ferrugineo-fuscis, corio macula parva triangulari marginis apicalis media ochracea; membrana albicante, areola cum venis nigro-fusca; capite infra oculos rostrato-producto, ab antico viso latitudine basali nonnihil longiore, parte anteoculari parte oculifera paullulum longiore, fronte vitta tenui media dense albo-pubescente; articulo secundo antennarum primo distincte paullo longiore; pronoto crebre sat fortiter punctato; scutello hemielytris laevibus. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{2}{5}$ mm.

Trinidad, Wi, D. HEIDEMANN.

A *C. caligineo* STÄL capite apicem versus longius producto, saltem aequae longo ac postice lato, pronoto multo minus transverso, parte ejus apicali angustiore, a *C. rostrato* m. capite paullo brevius producto, antennis aliter constructis, pronoto fortius punctato, nonnihil transverso, limbo ejus basali concolore, scutello minore etc. divergens. Caput basi pronoti paullo magis quam $\frac{1}{4}$ angustius, vertice oculo fere duplo latiore. Rostrum medium mesosterni attingens, articulo primo capite circiter duplo brevior. Antennae articulo primo capite ab antico viso circiter $\frac{3}{7}$ brevior, apicem clypei vix superante. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{1}{5}$ brevius, lateribus ultra tertiam apicalem partem subparallelis, dein fortiter divergentibus, parte apicali callos ferente basi fere dimidio angustiore, callis rectangularibus, sulco medio postice haud prolongato disjunctis. Scutellum pronoto paullo magis quam dimidio brevius, leviter transversum, planum, basi utrinque leviter impressum.

Pycnoderes quadrimaculatus GUÉR., Ramon de la Sagras, Hist. phys., pol. et nat. Cuba VI, 1857, p. 404.

Exemplare, die mit dem Typus, gegenwärtig im K. K. Hofmuseum in Wien, übereinstimmen, sind in Arizona (Phönix) von HEIDEMANN gefunden und mir fraglich unter dem Namen *P. incurvus* DIST. mitgeteilt worden. Von diesem, von dem ich einige von DISTANTS Cotypen verglichen habe, weichen sie durch viel niedrigere Pronotum-buckel ab. In dieser Hinsicht stimmen sie mit einer anderen, bedeutend grösseren Art, die HEIDEMANN mir unter