

als Glied 2. Der Vorderrand der Öffnung des männlichen Genitalsegments trägt links ein kleines rundliches Tuberkel, aber keinen Zahn an dem linken Grundwinkel. Die linke Forceps ist stark fast rechtwinklig gekrümmt; was ich l. c. als Forceps sinistra beschrieben habe ist der Penis. Es ist kein Zweifel, dass DISTANTS *Compsocerochoris vilis* nur gelbliche, vielleicht verbleichte Exemplare von *Ph. tibialis* REUT. repräsentiert. BAKER hat mir von diesem sehr schöne, typische Exemplare aus Nicaragua (Chinandego) gesandt.

### **Phytocoris politus** n. sp.

Oblongus, pallide testaceus vel livido-ochraceus, ubique aequaliter sat fortiter nitidus, subglaber, parum signatus, pronoto fascia tenui basali obscure fusca, margine pallido, scutello ante apicem utrinque macula parva marginali obscure fusca; margine corii costali vix variegato, cuneo ochraceo; membrana grisea, hyalino-irrorata, limbo exteriori ante medium maculis duabus hyalinis, venis omnibus ochraceis; capite basi pronoti circiter  $\frac{1}{3}$  angustiore, a supero viso latitudine sua postica circiter dimidio brevior, perpendiculari, a latere viso altitudine basali saltem  $\frac{2}{5}$  brevior, fronte fortiter declivi, gula brevi; vertice maris oculo paullulum latiore, oculis convexis, fusco-virescentibus, a supero visis orbicularibus; antennis nigro fuscis, articulo primo sat gracili, lineari, pronoto aequae longo, fusco, albo-variegato, secundo primo circiter  $2\frac{1}{3}$  et margine basali pronoti fere dimidio longior, solum basi anguste niveo, parte nivea crassitiei aequae longa, tertio primo vix longior, basi angustissime niveo; pronoto latitudine basali circiter  $\frac{3}{7}$  brevior, capite a supero viso fere duplo longior, apice quam basi dimidio angustior, lateribus subrectis, disco apicem versus sat declivi; hemielytris maris abdomen modice superantibus, corio pronoto duplo longior; pedibus ochraceo-fuscis, femoribus maculis minutis albis adspersis, posticis latitudine basali circiter quintuplo longioribus, tibiis annulis duobus albidis signatis, his annulis iis obscurioribus angustioribus; segmento maris genitali fuscescente, ad sinum sinistrum aperturam mutico, in ferne medio carina longitudinali instructo. ♂. Long  $5\frac{1}{2}$ —6, lat.  $2\frac{2}{5}$  mm.

Ormsby, Co, Nev., m. julii, D. BAKER.

Species corpore ubique cum hemielytris aequaliter sat fortiter nitido, parum signato, testaceo vel livido-ochraceo distinctissima.

### **Phytocoris brevisculus** REUT., Öfv. Vet. Akad. Förh. 1875, N:o 9, p. 68, 2.

Diese Art ist wahrscheinlich manchmal von den Amerikanern verwechselt worden. Wenigstens hat mir HEIDEMANN unter obigem Namen auch eine recht verschiedene Art, den *Ph. conspersipes* n. sp., gesandt. Der echte *Ph. brevisculus* ist noch kürzer, aber überall schwach glänzend, fein bleich behaart („subtiliter pallido-pubescent“) ohne schwarze Behaarung. Auch die Halbdecken sind überall gleichmässig glänzend. Der Körper ist unten weisslich, die Beine verschieden gefärbt, die Hinterschenkel kürzer und dicker. Die Grundfarbe hellrethgrau, die Zeichnung spärlich. Der Kopf (des Weibchens) ist etwa  $\frac{1}{3}$  schmaler als der Hinterrand des Pronotums, schwach transversell, von der Seite gesehen etwa  $\frac{1}{3}$  kürzer als hinten hoch, der Angulus facialis rechtwinklig. Die Stirn mit feinen bleich rostbraunen Querlinien; der Scheitel (♀) etwa  $\frac{1}{3}$  breiter als die Augen. Der Vorderrücken fast halb so kurz wie hinten breit, die Seiten fast gerade, die Scheibe nur gleich vor dem Hinterrande mit fünf kleinen schwarzbraunen Flecken versehen, die hinten durch eine feine Querlinie wellig verbunden sind. Das Schildchen mit zwei bräunlichen Makeln. Besonders charakteristisch sind die kurzen, gleichmässig ziemlich schwach glänzenden Halbdecken, deren Corium höchstens doppelt so