

lang wie der Vorderrücken und deren Cuneus viel stärker abschüssig, als gewöhnlich bei den *Phytocoris*-Arten, ist. Die Zeichnung ist spärlich: nur eine graubräunliche Strieme an der Clavalsutur des Coriums, die sich im ersten Drittel nach aussen biegt und sich hier etwas verbreitet; am Hinterrande des Coriums eine mehr oder weniger deutliche Querbinde; die Clavalrippe und der Aussenrand des Coriums schwach und fein bräunlich gesprenkelt, Cuneus bräunlich bespritzt mit zwei braunen Strichen am Innenrande. Membran glashell, aber sehr dicht bräunlich gesprenkelt, die Zellen gleichförmig licht bräunlich, Zellrippen bräunlich. Unten ist die Art weisslich mit bräunlich dicht bespritztem Bauche. Beine mit den Hüften weisslich; Vorder- und Mittel-Schenkel mit Reihen schwärzlicher Striche, Hinterschenkel, mit Ausnahme des Grundes, rauchgrau, dicht fein weiss gesprenkelt. Sehr charakteristisch sind die kurzen Hinterschenkel, die nicht mehr als dreimal so lang wie hoch sind. Vorder-Schienen mit dem Grunde, der Spitze und zwei Ringeln schwarzbräunlich, die weissen Ringel etwas breiter als die schwärzlichen; die Ringel der mittleren und hinteren Schienen weniger begrenzt, mehr gesprenkelt. Mit *Ph. conspersipes* hat diese Art nur das kurze erste Fühlerglied gemein. Dieses ist ein wenig kürzer als der Vorderrücken, linear, weiss und braun gesprenkelt; die übrigen Glieder graulich braun, Glied 2 etwas mehr als doppelt so lang wie 1 und nur wenig länger als der Hinterrand des Vorderrückens, der weisse Grundringel wenigstens doppelt so breit wie die Dicke des Gliedes.

Ich kenne die obige Art bisher nur aus Texas (BELFRAGE). Ein Exemplar des echten *Ph. breviusculus*, ebenfalls aus Texas (S. Diego), ist mir von Herrn HEIDEMANN zugesandt worden.

### ***Phytocoris conspersipes* n. sp.**

Superne pallide cervino-testaceus, obscurius variegatus, albo-intricato-pubescens, dense sat breviter semiadpressim nigropilosus; capite et pronoto nitidulis, illo ferrugineo, arcu verticis inter oculos, striis transversalibus tenuibus frontis, macula utrinque supra basin antennarum lineisque clypei et lorarum pallide flavis, vel pallide flavo, ferrugineo-variegato; pronoto strictura apicali in ferrugineum vergente vel maculis duabus mediis ferrugineis, mox ante marginem pallidum basalem fascia tenui obscure fusca; scutello fuscescenti-ferrugineo, apice sat late pallide flavente; hemielytris obscure nonnihil virescenti-fuscis vel castaneis, opacis, clavo margine scutellari commissuraque nitidis, glaucis vel fere chalybeis, corio sutura clavi tenuiter, basi, macula media obliqua quadrangularem aliaque apicali rhomboidali in angulum interiorem cunei extensa nec non saepe limbo toto externo glauco-vel subchalybeo-nitentibus, margine exteriori minute fusco-variegato; cuneo margine interiore ante medium punctis duobus dense nigro-pilosis; membrana cum areolis griseo-fumata, pulchre iridescente, solum stria inter apicem cunei et areolam minorem aliaque mox ante medium limbi exterioris cum illa saepe conjuncta hyalinis, venis nigricantibus, brachiali apicem versus connectenteque albis; inferne fuscus, nitidus; rostro pallido; antennis nigris, articulo primo lineari, albo-guttuloso, pronoto ab antice viso fere  $\frac{1}{4}$  brevior, setis rigidis crassitie articuli aequae longis, articulo secundo primo circiter duplo ( $\varnothing$ ) vel  $2\frac{3}{4}$  ( $\sigma$ ) et margine basali pronoti paullulum ( $\varnothing$ ) vel circiter  $\frac{2}{5}$  ( $\sigma$ ) longior, sublineari ( $\sigma$ ) vel versus apicem sensim leviter incrassato ( $\varnothing$ ), ima basi angustissimo albido, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo aequae longis ( $\sigma$ ) vel hoc parum longioribus ( $\varnothing$ ), tertio extrema basi albido, quarto primo longior et tertio  $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$  brevior; coxis pallidis; femoribus, tibiisque fuliginoso-fuscis, femoribus omnibus tibiisque tota longitudine guttis albis conspersis, tibiis anticis interdum annulis duobus albidis distinctis, posticis annulo albido in tertia basali parte; femoribus posticis altitudine circiter quadruplo longioribus, tibiis nigricanti-vel pallido-spinulosis, spinulis tibiicarum posticarum crassitie tibiae longioribus; capite basi pronoti fere  $\frac{1}{4}$  angustior, ab antico viso transverso, a latere viso