

nigricanti- et albo-conspurcatis, anterioribus albis, basi et apice annulisque duobus vel intermediarum tribus nigro-fuscis, his annulis albis latioribus; spinulis tibiaram albidis, tibiaram posticarum crassitie tibiae longioribus; tarsis fuscis; capite subverticali, basi pronoti circiter  $\frac{1}{3}$  angustiore, ab antico viso levissime transverso, a latere viso altitudine basali fere dimidio brevior, clypeo leviter prominente; vertice oculo aequae lato ( $\text{♀}$ ) vel hoc distincte angustiore ( $\text{♂}$ ); oculis a superno visis orbicularibus; pronoto latitudine basali circiter  $\frac{2}{5}$  brevior, lateribus subrectis; hemielytris ( $\text{♂}$   $\text{♀}$ ) abdomen sat breviter superantibus, corio pronoto fere duplo et dimidio longiore; segmento maris genitali ad angulum sinistrum aperturae mutico. Long.  $5\frac{1}{2}$ , lat. 2 mm.

Texas (Mus. Holm.); Cabn Jn, Md, Washington, DC., d. 3 junii, D. HEIDEMANN, Claremont, Cal., D. BAKER, 1  $\text{♂}$ .

### **Phytocoris minutulus** n. sp.

Parvulus, subelongatus, superne obscure fumatus, sat parce nigro-signatus, opacus; capite et apice pronoti guttulis minutis albis parce notatis, pronoto fascia basali integra tenui nigra ante marginem albidum, scutello ante apicem vittis duabus nigris; hemielytris limbo costali albido-variegato, macula apicali corii parvula in basin cunei prolongata dilute cinerea, nitida; membrana hyalina, cinereo-conspersa, venis griseis, cubitali nigricante, limbo externo ante medium maculis duabus hyalinis; inferne nigricans; rostro ( $\text{♂}$ ) medium ventris subattinente, albido, apice nigro; antennis corpore cum hemielytris longioribus, tenuibus, obscure griseis, articulo primo nigro- et albo-variegato, lineari, pronoto tertiaeque parti capitis aequae longo, secundo primo circiter duplo et margine basali pronoti circiter  $\frac{2}{3}$  longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo sat multo longioribus, gracillimis, tertio secundo parum magis quam  $\frac{1}{3}$  brevior, basi anguste albido, hac parte albida crassitie articuli parum longiore, quarto primo paullo longiore; coxis albidis, femoribus albidis, dense nigricanti-conspurcatis, posticis latitudine circiter quintuplo longioribus, tibiis gracilibus, albidis, annulis tribus nigris notatis, his annulis quam iis albidis angustioribus, tarsis nigricantibus; capite ( $\text{♂}$ ) fortiter nutante, a superno viso basi pronoti solum circiter  $\frac{1}{5}$  angustiore, pronoto  $\frac{1}{4}$  brevior et latitudini verticis oculique unici vix aequae longo, vertice oculo vix aequae lato; capite ab antico viso leviter transverso, a latere viso altitudine distinctissime brevior, gula leviter obliqua; oculis maris nigris, granulatis, a superno visis exsertis, orbicularibus; pronoto latitudine circiter  $\frac{3}{7}$  brevior, apice quam basi dimidio angustiore, lateribus rectis, disco versus apicem sat fortiter declivi; hemielytris abdomen sat longe superantibus, corio pronoto circiter  $2\frac{2}{3}$  longiore; segmento maris genitali ad sinum sinistrum aperturae mutico.  $\text{♂}$ . Long. 5, lat.  $1\frac{2}{5}$ — $1\frac{1}{2}$  mm.

Plummer's I, Md., d. 26 julii 1903, unicum specimen, D. O. HEIDEMANN.

Species statura minutula, subelongata, colore obscuro, capite maris basi pronoti solum  $\frac{1}{5}$  angustiore, antennis tenuibus, articulis ultimis tenuissimis simul sumtis secundo sat multo longioribus, pronoto fortius transverso, corio solum macula apicali nitida notato signaturaque tibiaram distincta. A *Ph. annulicorne* REUT. et *antennali* n. sp., quibus statura nonnihil similis, structura capitae coloreque antennarum mox distinguenda.

### **Phytocoris fenestratus** n. sp.

Oblongus, superne obscure fuscus, dense albo-farinoso-pubescentis, capite postice pronotoque antice nigro-pilosis, pronoto postice hemielytris brevisissime nigro-pubescentibus,