

Spitze stark verschmälert, rötlich angehaucht, hell gesprenkelt. Vorder- und Mittelschienen weiss und braun geringelt, die weissen Ringel viel breiter als die dunklen. Hinterschienen am Grunde licht bräunlich gesprenkelt mit den gewöhnlichen Stacheln und noch einigen längeren feinen Haaren versehen, die Stacheln ein wenig länger als die Dicke der Schiene. Das Genitalsegment des Männchens an der linken Seite der Öffnung unbewehrt.

**Phytocoris bakeri** n. sp.

Oblongus, albidus, superne cervino-variegatus, opacus; antennis fuscescenti-cinereis, articulo primo minute albo-adsperso, pronoto capitique usque ad apicem oculorum longitudine subaequali, sat incrassato et apicem versus distincte attenuato, secundo et tertio basi anguste niveis, illo primo circiter  $\frac{2}{3}$  longiore et margine basali pronoti circiter  $\frac{1}{3}$  longiore, parte basali nivea crassitie distincte longiore, articulo tertio primo parum longiore, quarto primo distincte brevior; pedibus albidis, femoribus, basi excepta, fusco-cinereis, albo-adspercis, posticis in tertia apicali parte fascia obliqua albida signatis, crassitie maxima circiter sextuplo longioribus, tibiis tenuissime albo-spinulosis, (spinulis pilaeformibus), basi et apice fuscis, anticis adhuc annulis duobus, intermediis tribus fuscis signatis, annulis albidis his fuscis saltem aequae latis, tarsis fuscescentibus; capite basi pronoti circiter  $\frac{1}{3}$  angustiore, a supero viso latitudini verticis oculique unici aequae lato, vertice ( $\sigma$ ) oculo paullo magis quam dimidio latiore; capite a latere viso altitudini basali aequae longo, fronte parum declivi, solum apice subito subperpendiculari, clypeo usque a basi fortiter prominente, gula subhorizontali; oculis sordide virescentibus, a supero visis orbicularibus; rostro apice nigro, basin segmenti secundi ventralis attingente; pronoto a basi versus apicem sensim sat declivi, latitudine basali circiter  $\frac{2}{5}$  brevior, apice quam basi dimidio angustiore, lateribus late levissime sinuatis, fuscescenti-cervino, apice albido, basi fascia tenui nigra signato, margine basali niveo; scutello albido; hemielytris dilute fuscescenti-cervinis, clavo limbo scutellari et commissura, corio basi, margine costali maculae rhomboidali apicali in basin cunei continuata albidis, margine costali minute fusco-variegato; membrana cum areolis fumata, venis omnibus pallidis, sordide albidis, disco albido-irroroto, limbo exteriori ante medium maculis duabus albidis; segmento maris genitali ad sinum sinistrum aperturae mutico.  $\sigma$ . Long. 5—5  $\frac{1}{3}$ , lat. 1  $\frac{3}{5}$ —1  $\frac{2}{3}$  mm.

Claremont, Cal., D. BAKER.

Species structura insigni antennarum, spinulis tibiatarum tenuissimis pilaeformibus coloreque distinctissima.

**Phytocoris vittatus** n. sp.

Valde oblongus, canescenti-cinereus, sub opaculus, dense subtiliter albotomentosus, pilis nigris subdestitutus; capite dilute fusco-fumato, innotato; pronoto lateribus vittisque duabus percurrentibus discoidalibus parallelis fuscis vel nigricantibus, tomento albo destitutis, vittis tribus percurrentibus parallelis albo-tomentosis, limbo basali tenuiter pallido punctis quatuor dense nigro-pilosellis; scutello angulis basalibus vittisque duabus percurrentibus parallelis nigricantibus, tribus albo-tomentosis, quarum intermedia tenui; hemielytris vitta clavi commissurae parallele, vitta basali corii exteriori medium vix attingente aliaque interiori majore longitudinali, a medio ad apicem ducta sericeo-nigris, cuneo apice, punctis marginis interioris vittaque angulum interiori terminante nigris, corio macula apicali paullulum pallidior parum nitida; membrana cinerea, parum hyalino-adspersa, vena brachiali tenuiter albida, limbo exteriori ante medium maculis duabus hyalinis; inferne nigricanti-cinereus; rostro