

Ft Pendln, W. Va., D. HEIDEMANN.

Species statura angusta, elongata, capite fortiter nutante albido, innotato, pronoto apice medioque disci nec non scutello albidis, membrana aequaliter nigro-fusca nec hyalino-irrorata spinulisque tibiarum crassitie tibiae longioribus facile distinguenda.

Phytocoris canescens n. sp.

Elongatus, sordide albido-canescens, opacus, tenuiter albo-pubescent, pilis nigris destitutus, sat parce nigro-adspersus; pronoto scutelloque linea media longitudinali tenuissima albida obsoleta vel nulla, antennis tenuibus, corpore cum hemelytris longioribus, articulo primo linearis, pronoto capitique a supero viso fere aequo longo et margini basali pronoti paullo longiore, albo- et nigro-variegato, parce albo-setoso, setis crassitie articuli longioribus; secundo gracili, leviter curvato, primo saltē duplo longiore, nigricanti-griseo, basi annuloque angusto infra medium albis, parte alba basali crassitie longiore, ultimis gracillimis, nigricanti-griseis, tertio primo longitudine subaequali, basi albido, quarto tertio circiter $\frac{1}{4}$ breviore; rostro segmentum secundum ventrale attingente; pedibus longis et gracilibus, femoribus anterioribus apicem versus nigricanti-conspurcatis, posticis valde gracilibus, crassitie basali fere sextuplo longioribus, basi excepta fusco-nigricantibus, hic illuc parcius albo-variegatis, tibiis anterioribus basi et apice sat late annulisque duobus nigricantibus, annulis albis illis nigricantibus saltem aequo latis, tibiis posticis corio et cuneo simul sumtis aequo longis, basi et apice late nigricantibus, adhuc hic illuc punctis nigris interdum confluentibus parcius adspersis, spinulis tenuibus albis, crassitie tibiae parum longioribus; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ angustiore, a supero viso pronoto paullo breviore et latitudini verticis oculique unici aequo longo, vertice (♀) oculo fere dimidio latiore; capite ab antico viso latitudini posticæ aequo longo, a latore viso altitudine basali fere paullo longiore, fronte subhorizontali, solum apice subito fortiter declivi, clypeo a basi fortiter prominente, angulo faciali recto, gula horizontali; oculis subtilli granulatis, a supero visis subsemi-orbicularibus; pronoto latitudine basali circiter $\frac{3}{7}$ breviore, lateribus subrectis, disco versus apicem sat fortiter declivi, parum convexo, limbo basali strigis 4—6 nigris; hemelytris abdomen longe superantibus, parce praecipue in margine costali nigricanti-adspersis, cuneo strigis duabus suturae membranae nigricantibus, membrana hyalina, cinereo-conspersa, venis omnibus pallidis, limbo exteriore ante medium maculis duabus hyalinis; ventre lateribus infuscato. Long. 6 $\frac{1}{3}$, lat. 1 $\frac{3}{5}$ mm.

Claremont, Cal., D. BAKER.

Species colore, corpore elongato, parum signato, antennis pedibusque valde longis et gracilibus insignis.

Feminam verisimiliter hujus speciei, in Ogden, Utah d. 10 Julii 1900 captam micit D. HEIDEMANN. Differt a descriptione superne data articulo primo antennorum margini basali pronoti aequo longo, pronoto fascia integra basali lateribusque postice nigricantibus, scutello apice nigro-bivittulato, hemelytris hic illuc vittulis brevibus nigricantibus parce signatis. Long. 7, lat. 2 mm.

Phytocoris lineatus n. sp.

Elongatus, sordide albido-canescens, levissime in grisescentem vergens, pilis nigris destitutus, parce griseo-variegatus, linea tenui alba longitudinali per caput, pronotum et scutellum ducta, scutello obscure griseo; utrinque vitta longitudinali alba signato, pronoto ante marginem albidum basalem fascia tenui integra nigricante, hemelytris venis hic illuc tenuiter