

charakteristisch für *Paracalocoris* angegeben worden sind. Sie begrenzen nämlich bei dieser Gattung hinten die Calli, die hier gewöhnlich fast die Mitte der Scheibe erreichen. Wohl treten bei *Eurycyrtus* zwei oft tiefschwarze Diskoidalpunkte des Pronotums auf, diese aber stehen viel mehr nach hinten, weit von den viel kürzeren Calli, und sind auch viel weiter auseinander gerückt und gar nicht „excavated“. Sie bieten darum nur eine sehr oberflächliche Analogie mit den Diskoidal-Punkten des Pronotums von *Paracalocoris*, mit welchen sie gar nicht homolog sind. Auch die Behaarung des Körpers ist bei den beiden Gattungen verschieden: die Pubescenz des *Eurycyrtus*, die oben und unten oder bisweilen nur oben auftritt, ist kurz, etwa schuppenartig und meistens metallisch, die des *Paracalocoris* feiner, länger, dünner und weicher.

Paracalocoris scrupeus (SAY). — *Capsus* id. SAY, Het. New. Harm. Ind. 1831, p. 23, 13. Compl. Writ. I, 1859, p. 342, 13. — *Phytocoris* id. UHLER, Bull. Un. St. Surv. II, 1876, p. 317. WALK., Cat. Het. Brit. Mus. VI, 1873, p. 97. UHLER Checklist, 1886, p. 18. ATKINS., Cat. of Caps. 1889, p. 67. WIRTN., Prel. List. Hem. West. Penn. p. 199, 131. *Var. externa* (H.-SCH.). — *Capsus* id. H.-SCH., Wanz. Ins. VIII, p. 16, f. 791.

Diese Art, von welcher WIRTNER mir zahlreiche Exemplare gesandt hat, ist ein ganz typischer *Paracalocoris*, welchen UHLER (und nach seinem Beispiele WALKER, ATKINSON und WIRTNER) unbegreiflicher Weise in der Gattung *Phytocoris* untergebracht hat, von welcher er durch die Konstruktion der Fühler und Beine sofort zu unterscheiden ist. Ein ebenso typischer *Paracalocoris* ist auch die folgende, ebenfalls von UHLER und seinen oben genannten Nachfolgern als eine *Phytocoris* gedeutete Art:

Paracalocoris colon (SAY). *Capsus* id. SAY, Compl. Writ. I, 1859, p. 346, 25. — *Phytocoris?* id. UHL., Checklist, 1886, p. 18. ATKINS., Cat. Caps. 1889, p. 64. *Phytocoris* WIRTN., Prel. List. Hem. West. Penn., p. 199, 130.

Zwei Exemplare aus Pennsylvania, von Herrn WIRTNER zugesandt.

Paracalocoris deleticus (UHL.). — *Calocoris deleticus* UHL. msript.

Ovalis, sordide albidus, opacus, oculis nigris; pronoto punctis duobus discoidalibus distantibus mox pone callos positus, vitta clavi versus angulum scutellarem vittisque duabus obliquis apicalibus corii nigris, cuneo laete fulvo, angulo interiore late marginibusque sordide albidis, membrana albido-hyalina venis albidis; rostro, antennis pedibusque colore corporis, articulo ultimo rostri nigro; articulo secundo antennarum apicem versus ultimisque fuscis vel nigricantibus, tertio basi albidus; femoribus apice nigricanti-adspersis; capite (♂) a supero viso basi pronoti dimidio angustiore et pronoto circiter $\frac{2}{5}$ brevior, ab antico viso latitudini basali aequo longo, a latere viso altitudini basali longitudine subaequali, clypeo sat prominente, basi ejus longius supra medium altitudinis capitis a latere visi posita, genis sat altis; vertice (♀) oculo magis quam duplo latiore; rostro apicem coxarum intermediarum attingente; antennis articulo primo capite ab antico viso distincte brevior, sat leviter incrassato, secundo primo graciliore, hoc circiter duplo longiore at margine basali pronoti paullulum brevior, versus apicem sensim leviter incrassato, duobus ultimis gracilibus, simul sumtis secundo paullulum