

brevioribus, quarto tertio adhuc graciliore et huic vix aequae longo; pronoto latitudine basali vix magis quam $\frac{1}{5}$ brevior, strictura apicali articulo primo antennarum vix aequae crassa.

♀. Long. 6, lat. 3 mm.

Lamar, Col., d. 9 oct. 1898; commun. D. VAN DUZEE.

Species colore signaturisque distinctissima.

Paracalocoris heidemanni n. sp.

Ovalis, pallide flavo-testaceus, leviter nitidulus, pronoto mox pone callos maculis duabus aterrimis opacis subrotundatis vel subquadratis, lateribus vittisque duabus disci postici pronoti nec non hemielytris fusco-testaceis vel isabellinis, clavo margine scutellari commissuraque, corio sutura clavi, vitta per venam cubitalem usque ad suturam membranae ducta margineque toto costali pallide flavo-testaceis, membrana cum areolis nigricanti-fumata, saepe disco pallecente, venis pallide flavo-testaceis; rostro apicem coxarum posticarum attingente, apice nigro; antennis testaceis, articulo primo capiti ab antico viso aequae longo, elongato-obconico, secundo primo circiter $\frac{3}{4}$ longiore et margini basali pronoti aequae longo, versus apicem sensim sat leviter incrassato et nigro, apice articulo primo distincti graciliore, duobus ultimis gracilibus, simul sumtis secundo aequae longis, nigris, tertio basi anguste albo, quarto tertio longiore; pedibus colore corporis, femoribus posticis versus apicem fuscescenti-variegatis, tibiis concoloriter spinulosis, spinulis crassitiei tibiae aequae longis; epipleuris pronoti vittis duabus fuscis longitudinalibus ad marginem superiorem, mesosterno fuscescente, ventre utrinque vittulis marginalibus longitudinalibus biseriatis fuscis; capite basi pronoti dimidio angustiore, ab antico viso latitudini posticae aequae longo, a latere viso altitudini basali aequae longo, angulo faciali subacuto, gula peristomio aequae longa; vertice (♀) oculo duplo latiore; pronoto latitudine basali parum magis quam $\frac{1}{3}$ brevior, apice quam basi paullo minus quam $\frac{2}{3}$ angustiore, lateribus rectis, disco versus apicem sat fortiter declivi, sublaevi; hemielytris (♀) abdomen sat breviter superantibus. ♀. Long. $6\frac{1}{3}$, lat. $2\frac{1}{3}$ mm.

Aurora, W. Va., d. 19 aug. 1904, D. HEIDEMANN.

Paracalocoris multisignatus n. sp.

Oblongo-ovalis, pallide flavus, nitidulus, oculis nigro-fuscis, pronoto mox pone callos maculis duabus parvulis subquadratis aterrimis, opacis, angulis posticis vittisque duabus disci postici sat late umbrinis; scutello dimidio basali, macula parva basali utrinque lineaque longitudinali exceptis, umbrino; hemielytris umbrinis, guttulis minutis pallide flavis adspersis, quarta parte apicali clavi, basi maculisque duabus corii, altera mox infra medium, altera apicali, cuneoque, basi et apice exceptis, pallide flavis; membrana pallida, subhyalina, venis pallide flavis, areolis umbrinis, interdum etiam macula ad apicem cunei aliaque majore ad mediu-mlimbi exterioris cum vitta infra areolas confluyente umbrinis; inferne pallide flavus, unicolor; rostro apicem coxarum posticarum attingente, apice nigro; antennis articulo primo flavo, umbrino-consperso, capiti ab antico viso saltem aequae longo, elongato, apice oculo a supero viso circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, articulo secundo primo duplo et margine basali pronoti parum longiore, sat gracili, versus apicem leviter incrassato et fere tertia apicali parte nigro, ipso apice eodem articuli primi sat multo graciliore, articulis duobus ultimis capillaribus, simul sumtis secundo parum longioribus, fuscis, tertio basi flavo, quarto tertio adhuc tenuiore et hoc longiore; femoribus pallide flavis, praecipue posticis apicem versus umbrino-conspurecatis, tibiis tarsisque umbrinis, illis annulo subbasali alioque submediano vel posticarum supra medium po-