

oder fast in der Ebene des Peristomiums gelegen, der Schnabel reicht an das Ende der Mittelhüften (bei anderen Arten derselben Gattung bis an die Spitze der Hinterhüften). Die Pronotumspitze ist zwischen und vor den Schwienen glatt.

Die Art variiert in der Farbe von gelblich rötlich bis nelkenbraun. Ich gebe hier eine allgemeine Diagnose und Beschreibung der Varietäten:

L. rubecula (UHL.):

Oblonga, nitida, superne pallido-pubescent, colore variabilis, plerumque autem linea media longitudinali capit, strictura apicali, linea media longitudinali marginaque basali pronoti, hoc tenuissime, apice saepeque etiam linea longitudinali scutelli lividis; capite basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustiore, a supero viso pronoto vix dimidio breviore, vertice oculo duplo (♀) latiore; antennis fusco-testaceis vel nigro-piceis, articulo secundo interdum medio late testaceo, articulo primo capite ab antico viso circiter $\frac{1}{3}$ breviore, secundo primo saltem duplo et dimidio longiore et margini basali pronoti aequo longo, tertio secundo paullo minus quam dimidio breviore; pronoto latitudine basali circiter $\frac{1}{3}$ breviore, lateribus ante medium leviter sinuatis, callis transversis, convexis, nitidis, tertiam apicalem partem haud superantibus, disco postico fortiter rugoso-punctato; scutello sat dense transversim subtiliter strigoso; hemelytris abdomen sat longe superantibus, sublaevibus, clavo obsolete subtiliter punctato. Long. $5\frac{4}{5}$, lat. $2\frac{1}{5}$ mm.

Var. α *lurida*: Tota cum antennis pedibusque lurida, apice scutelli albido-flavo, cuneo apice oblique ferrugineo, membrana dilute flavicanti-hyalina, venis luridis. ♂.

Lake Placid, N. Y., d. 8 decembris 1904, D. VAN DUZEE.

Var. β *rosacea* (UHL. in litt.): Pallide testacea, superne rufotestacea, saepe corio basi et limbo costali cuneoque pallidis, hoc apice oblique ferrugineo; antennis pedibusque flavotestaceis, illis apice articuli secundi ultimisque nigro-fuscis, femoribus saepe rufesceni-testaceis; membrana cum areolis griseo-fumata, venis pallidis, macula ad apicem cunei hyalina.

Noeborus rosaceus UHL. in litt.

Chicago, Ill., D. W. I. GERHARD, comm. D. HEIDEMANN; Colorado, D. BAKER (Mus. Hung.)

Var. γ : Clypeo, callis pronoti scutelloque, apice hujus lineaque media exceptis, piceo-fuscis, clavo corioque interne infuscatis; cetero ut praecedens.

Canada, comm. D. BAKER.

Var. δ *infuscata*: Ut var. α , sed clypeo vittisque duabus frontis latis piceis; articulo secundo antennarum etiam basi piceo; clavo, apice excepto, corioque infra medium interne caryophylleo-fuscis. ♂.

Colorado, D. BAKER (Mus. Hung.).

Var. ϵ *obscura*: Inferne cum rostro et pedibus pallide livida vel albido-flavens, vitta marginali corporis utrinque sat lata piceo-nigra; capite cum antennis piceo-nigro, macula apicali utrinque juxta clypeum, vitta media marginibusque orbitalibus frontis albido-lividis; pronoto hemelytrisque fumatis, illo strictura apicali lineaque media longitudinali albido-lividis, callis piceo-nigris, nitentibus; scutello piceo-nigro, marginibus lateralibus basin versus lineaque media longitudinali percurrente albido-lividis; hemelytris nigricanti-fumatis, margine costali