

cuneoque pallide albido-lividis, cuneo apice interne anguste nigro; membrana nigricante, venis albido-lividis, macula ad apicem cunei hyalina. ♀.

Lake Placid, N. Y., d. 5 decembris 1904, comm. D. VAN DUZEE.

### **Lygidea mendax** n. sp.

Oblonga, cinnabarina, clypeo, oculis, antennis, limbo basali pronoti (non tamen semper), scutello, basi et plerumque vitta mediana exceptis, clavo, dimidio vel magis quam dimidio interiore corii et cunei membranae cum venis nigricantibus, pedibus pallide flavo-testaceis, femoribus posticis apicem versus, tibiis anterioribus apice, tibiis posticis tarsisque omnibus nigris; capite basi pronoti circiter  $\frac{1}{3}$  angustiore, a superno viso pronoto circiter dimidio brevior et latitudine sua postica circiter dimidio brevior, oculo  $\frac{2}{3}$  (♂) vel duplo (♀) latiore, utrinque stria transversali vel leviter obliqua fortiter impressa, margine postico aequaliter carinato; capite ab antico viso latitudine verticis oculique unici paullo brevior (♂) vel huic fere aequae longo (♀), loris arcuatis, a latere viso altitudine basali parum brevior, clypeo sat prominente, basi arcuato, dein perpendiculari, basi a fronte impressione discreto, angulo faciali recto, genis oculo paullulum humilioribus (♂) vel huic fere aequae altis (♀), gula brevi, in vel fere in plano peristomii posita; oculis vix transversis; rostro apicem coxarum posticarum subattingente, nigricante, articulo primo rufescente, apicem xyphi prosterni subattingente; antennis articulo primo capite ab antico viso fere  $\frac{1}{3}$  brevior, secundo primo circiter  $2\frac{2}{3}$  (♀) vel  $2\frac{3}{4}$  (♂) et margine basali pronoti circiter  $\frac{1}{3}$  (♂) vel paullo (♀) longior, duobus ultimis simul sumtis secundo brevioribus, gracilibus; pronoto latitudine basali circiter  $\frac{2}{5}$  (♂) vel fere  $\frac{3}{7}$  (♀) brevior, apice quam basi dimidio angustiore, lateribus rectis, disco versus apicem modice declivi, callis bene elevatis, medio distantibus, spatio intra callos et stricturam apicalem transversa, subelevata, laevi, disco pone callos dense fortiter punctata; scutello crebre sat fortiter transversim strigoso; hemielytris abdomen sat longe superantibus, crebre subtiliter, clavo fortius, punctatis. ♂ ♀. Long.  $6\frac{1}{3}$ — $6\frac{1}{2}$ , lat. 2 mm.

Hamburg, N. Y., d. 7 et 8 sept. 1905, Gowanda, N. Y., d. 2 aug. 1907; Colden, N. Y., d. 7 julii 1907, D. VAN DUZEE.

*Tropidostephi cardinali* UHL. colore signaturisque simillima, notis autem genericis, praecipue structurae capitae, pronoto antice inter callos laevi nec punctato, rostro antennisque longioribus et distincte validioribus coloreque pedum nec non statura magis oblonga distinguenda.

### **Lygidea morio** n. sp.

Oblonga, nigra, sat nitida, hemielytris tenuiter pallido-pubescentibus; antennis, rostro pedibusque nigris, rostro medio tibiisque sordide obscure lividis, his ipso apice interdumque etiam basi nigris; capite basi pronoti circiter  $\frac{1}{3}$  angustiore, a superno viso pronoto vix magis quam  $\frac{1}{3}$  brevior et longitudine sua circiter duplo latiore, vertice oculo circiter  $\frac{3}{4}$  (♂) vel fere duplo (♀) latiore, margine postico carinato, utrinque ad oculum ante marginem transversim impresso, capite ab antico viso leviter transversa (♂) vel latitudini basali fere aequae longo, a latere viso altitudini basali longitudine subaequali, clypeo sat arcuato-prominente, gula in plano peristomii sita; rostro apicem coxarum intermediarum subattingente; antennis articulo primo capite ab antico viso circiter  $\frac{1}{3}$  (♂) vel  $\frac{2}{5}$  (♀) brevior, secundo primo duplo longior et margine basali pronoti aequae longo (♂) vel hoc fere  $\frac{1}{4}$  brevior (♀); pronoto latitudine basali circiter  $\frac{1}{3}$  brevior, lateribus leviter sinuatis, callis bene discretis, medio distantibus,