

disco ante et inter callos glabro, pone callos crebre sed sat subtiliter rugoso-punctato; scutello transversim crebre tenuiter strigoso; hemielytris sublaevibus, opaculis. ♂ ♀. Long. $5\frac{1}{2}$ —6, lat. $2\frac{4}{5}$ — $3\frac{1}{5}$ mm.

California, 2 ♂♂, 2 ♀♀ (Mus. Helsingf.).

Tropidosteptes UHL. mihi.

Corpus oblongo-ovale vel oblongum, glabrum, nitidum; capite basi pronoti $\frac{1}{3}$ — fere dimidio angustiore, fortiter nutante vel subperpendiculari, a supero viso pronoto circiter $\frac{2}{3}$ brevior et latitudine sua postica magis quam dimidio brevior, vertice margine postico tenui, plerumque tenuiter vel tenuissime, interdum obsolete, raro fortius carinato, ante marginem utrinque striola transversim impressa, medio saepe impressione longitudinali magis minusve distincta praedito; capite ab antico viso latitudine postica longitudine subaequali vel leviter transverso, loris arcuatis, a latere viso altitudine basali circiter dimidio brevior, clypeo parum vel leviter prominente, basi ejus cum fronte confluyente, angulo faciali acutiusculo, genis altis, maris interdum sat humilibus, gula distincta, obliqua vel subrecta; oculis a supero visis leviter (♀) vel fortius (♂) transversis, ab antico visis orbita interiore recta usque a basi apicem versus fortiter divergentibus, a latere visis oblongis, in genas leviter, raro (♂) longius extensis; rostro plerumque apicem mesosterni haud vel paullo superante, rarissime longiore; antennis ad vel paullo supra apicem oculorum interne insertis, gracilibus, articulis ultimis simul secundo brevioribus; pronoto magis minusve transverso, latitudine basali $\frac{1}{5}$ — fere $\frac{1}{3}$ brevior, strictura apicali callisque exceptis ubique (etiam ante et inter callos) fortiter vel sat fortiter punctato, callis convexis, optime discretis, nitidis, transversis vel leviter obliquis, medio distincte distantibus vel raro sub-confluentibus, tertiam apicalem partem pronoti haud vel parum superantibus, disco postico a basi versus callos convexo-declivi, margine basali truncato, lateribus subrectis; scutello pronoto brevior, basi obtecta vel subobtecta; hemielytris abdomen superantibus, lateribus levissime vel medio fortius rotundatis; membrana angulo interiore areolae majoris rotundato; metastethio orificiis destituto vel utrinque rima tenuissima instructo; coxis anticis medium mesosterni attingentibus; pedibus mediocribus, femoribus ubique aequae crassis, tibiis submuticis; tarsis posticis margine inferiore articuli primi eodem secundi fere longiore, articulo tertio duobus primis simul sumtis aequae longo; terebra feminae medium ventris superante.

Typus: *Tr. cardinalis* UHL.

In die obige Gattung gehört auch die als *Neoborus saxeus* und *N. amoenus* von UHLER benannte Art, wie auch einige noch unbeschriebene Arten. In wie weit die Gattung in der That mit *Neoborus* DIST. (Biol. Centr.-amer., Rhynch. Het. I, 1884, p. 276) identisch ist, ist unmöglich ohne Autopsie der Typen abzumachen, die uns nicht zugänglich gewesen sind; die Beschreibung DISTANTS ist, wie gewöhnlich, ganz ungenügend. Jedenfalls hat die von UHLER schon im Jahre 1878 gegebene Benennung die Priorität.

Tropidosteptes amoenus UHL.

Oblongo-ovalis, colore variabilis, glaber, sat nitidus, superne, capite excepto, sat crebre et sat fortiter punctatus; rostro pedibusque lividis, extremo apice rostri articuli tertii tarsorum nigro, capite basi pronoti $\frac{3}{7}$ angustiore, ab antico viso distincte transverso (♂) vel latitudine postica parum vel paululum brevior, genis oculo paullo magis quam dimidio (♂) vel paullo (♀) humilioribus, vertice postice tenuissime (♂) vel tenuiter (♀) marginato, oculo aequae lato (♂) vel hoc circiter $\frac{2}{3}$ — duplo latiore (♀), medio plerumque impressione longitu-