

Mihi ignotus restat: **C. robustus** UHL. in GILLETTE et BAKER Prem. List. Hem. Colo; 1895, p. 39.

Camptobrochis (Euarmosus) sayi (REUT.). — *Euarmosus* id. REUT., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 76, 1.

In der Tat ist der ganze Körperbau dieser Art mit dem des *Camptobrochis grandis* UHL. so nahe übereinstimmend, dass ich geneigt bin, für diese beiden Arten und eine noch unbeschriebene eine eigene Untergattung zu bilden; sie gehen jedoch durch *C. grandis*, besonders was die Farbe und Zeichnung betrifft, in die typische Formenreihe über. Alle drei sind weniger gewölbt, als im allgemeinen die *Camptobrochis*-Arten, der Kopf ist weniger geneigt, weniger quer, jedoch kaum länger als die Breite des Scheitels und des einen Auges, das Embolium in seiner ganzen Länge flächig erweitert, obwohl jedoch gegen die Spitze allmählig verengt. Die Behaarung des Körpers von *C. sayi* und *C. nigrita* n. sp. ist natürlich kein Grund, diese Arten generisch zu trennen; übrigens finden sich auch paläarktische behaarte *Camptobrochis*-Arten. Wohl ist das erste Fühlrglied des *C. sayi* etwas länger als gewöhnlich bei dieser Gattung, auch dieses Merkmal aber ist nicht von generischer Bedeutung. Das Fühlrglied 2 dieser Art ist, wie bei den *Camptobrochis*-Arten, deutlich, etwa $\frac{1}{4}$, kürzer als der Hinterrand des Pronotums. Das Pronotum etwa $\frac{2}{5}$ kürzer als hinten breit, seine Seiten vor der Spitze leicht abgerundet, die Spitze ein wenig schmaler als der Kopf, die Schwielen gewölbt, stark glänzend, in der Mitte zusammenfließend. Der Kopf ist fast $\frac{3}{5}$ schmaler als der Hinterrand des Pronotums.

Von dieser Art habe ich ein Exemplar aus Washington, Pa, untersucht.

Camptobrochis (Euarmosus) nigrita n. sp.

Sat late ovalis, superne leviter convexus, hemielytris dorso subdeplanatis, cum rostro, antennis et pedibus totus niger vel nigro-piceus, nitidus; capite basi pronoti circiter $\frac{4}{7}$ angustiore, modice nutante, a supero viso pronoto circiter $\frac{1}{3}$ brevior, vertice (♂) oculo circiter dimidio latiore, utrinque ad oculum striola impressa notato, medio latissime immarginato, capite ab antico viso latitudine cum oculis paullulum brevior, a latere viso altitudini basali saltem aequae longo, fronte sensim modice declivi, clypeo prominente, valde nutante, angulo faciali acuto, gula brevissima; rostro apicem coxarum intermediarum subattingente; antennis articulo primo apicem clypei paullo superante, capite ab antico viso saltem $\frac{3}{7}$ brevior, secundo primo circiter duplo et dimidio longior et margine basali pronoti circiter $\frac{1}{4}$ brevior, a basi gracili versus apicem sat fortiter incrassato, ultimis gracilibus, simul sumtis secundo brevioribus, tertio primo distincte longior, quarto primo vix aequae longo; pronoto latitudine basali circiter $\frac{3}{7}$ brevior, a basi versus apicem modice angustato, lateribus rectis apice subito obtuse angulatis, apice capiti cum oculis saltem aequae lato, marginibus lateralibus a latere visis acutis, callis leviter elevatis, nitidis, disco sat crebre punctato; scutello horizontali, laevi, solum punctis nonnullis minutis; hemielytris abdomen paullulum superantibus, modice dense (corio quam clavo subtilius) punctatis, embolio a basi late explanato apicem versus sensim fortiter acuminato et apice lineari cum corio subconfluente, cuneo modice declivi, membrana fumata, venis nigris. ♂. Long. $5\frac{1}{2}$, lat. 3 mm.