

Camptobrochis schwarzii UHLER, Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1893, p. 375.

Diese Art ist mit der vorigen nahe verwandt, unterscheidet sich aber von ihr durch die fast geraden, nur an der Spitze sehr schwach gerundeten Pronotum-Seiten, die weniger abgerundeten Seiten der Halbdecken und die Zeichnung des Schildchens. Das Fühlerglied 2 ist fast etwas mehr als $\frac{3}{7}$ kürzer als der Hinterrand des Pronotums, an der Spitze, wie die Endglieder, schwärzlich. Das gewölbte Pronotum fast nur halb so lang wie hinten breit, mässig dicht, stark punktiert. Die Halbdecken schwächer punktiert; der Cuneus ziemlich stark abschüssig.

Camptobrochis histrio (REUT.). — *Callicapsus* id. REUT., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 75.

Die Struktur-Verhältnisse dieser Art stimmen mit denen der Gattung *Camptobrochis* FIEB. vollkommen überein, auch die Zeichnung erinnert an die Zeichnung des *C. punctulatus* FALL. und *C. cerachates* (UHL.), nur dass die Grundfarbe rot statt schal-gelblich oder beinweiss ist. Es findet sich in der That kein Merkmal, das die Art von *Camptobrochis* genügend unterscheiden könnte, denn auch das erste Fühlerglied ragt nur kurz über die Spitze des Clypeus hervor, nicht, wie in der Beschreibung l. c. angegeben ist, „dimidia longitudine“. Der Kopf ist mehr als halb so schmal als der Hinterrand des Pronotums, nur wenig breiter als die Pronotumspitze, von vorne gesehen transversell, der Hinterrand des Scheitels gekielt. Das zweite Fühlerglied etwa $\frac{3}{8}$ kürzer als der Hinterrand des Pronotums. Die Pronotum-Seiten sind gerade, gegen die Spitze aber leicht abgerundet. Die Punktur ist schwächer als bei den verwandten Arten und gleichfarbig mit der Scheibe.

Camptobrochis validus n. sp.

Ovalis, sordide eburneo-flavescens, superne sat convexus, glaber, modice nitidus; impressione transversali verticis, vittis duabus frontis saepeque etiam clypeo nigris; callis pronoti nigris vel nigro-variegatis, nitidis; scutello fusco, angulis basalibus, apice lineaque vel vitta media eburneis; hemielytris unicoloribus pallidis vel clavo apice, corio macula mox infra medium magis minusve distincta anguloque apicali exteriore vel fascia magis minusve interrupta apicali, nec non cuneo apice nigris; membrana dilute fumata, venis sordide eburneo-flaventibus; corpore inferne piceo-variegato, mesosterno nigro; pedibus colore corporis, femoribus annulis duobus piceo-nigris vel totis, apice excepto, piceo-nigris, tibiis solum basi et apice vel etiam annulis duobus supra medium, tarsis apice piceis; rostro coxas intermedias attingente, apice nigro; antennis colore corporis, articulo primo capite dimidio brevior, secundo primo fere duplo et dimidio longiore et margine basali pronoti circiter $\frac{3}{7}$ brevior, versus apicem sat incrassato, apice ejus articulisque duobus ultimis nigricantibus, his simul sumtis secundo brevioribus; capite a supero viso pronoto circiter dimidio brevior, ab antico viso latitudine verticis oculique unici paullo brevior, a latere viso altitudine basali distincte brevior, vertice toto marginato, utrinque striola transversali vel leviter obliqua impressa notato; pronoto modice convexo, latitudine basali parum magis quam $\frac{2}{5}$ brevior, versus apicem sat fortiter angustato, apice quam basi circiter dimidio angustiore, lateribus subrectis, solum ipsa apice levissime curvatis, callis sat fortiter elevatis, disco irregulariter, sat fortiter et magis minusve dense punctato, punctis concoloribus vel fundo nigris; scutello dense rugoso-punctato; hemielytris magis minusve crebre punctatis, cuneo sat fortiter declivi. Long. 4 $\frac{3}{4}$ —5, lat. 2—2 $\frac{1}{4}$ mm.