

medium mesosterni longius superantibus; pedibus subtiliter nigro-pubescentibus, tibiis nigro-punctatis et nigro-spinulosis, tarsis posticis articulo tertio secundo longitudine aequali, unguiculis sat brevibus, a medio fortius curvatis, dente basali obtuso instructis, aroliis medium unguiculorum attingentibus.

A genere *Hoplomachus* FIEB. corpore tomento squamiformi albido vestito, solum capite et pronoto pilis paucis nigris, structura capitis longe producti valde divergente, rostro coxas intermedias haud superante, articulo ejus primo caput haud superante, oculis magis exsertis, in genas parum extensis, coxis anticis longioribus divergens.

Typus:

Hoplomachidea consors (UHL.). — *Hoplomachus* id. UHL., in RILEY, Rep. Coll. Ins. Death Vall. Exp., U. S. Dep. Agr., (North Amer. Fauna, N:o 7, 1893, p. 264).

Los Angeles, Co. Cal., comm. D. HEIDEMANN.

UHLER beschreibt unrichtig den Schnabel als „reaching behind the posterior coxae“. Der Kopf trägt eine gelbe Mittellinie, ist aber nicht in der Mitte „carinated“.

Div. Plagiognatharia.

Microphylellus nov. gen.

Corpus subelongatum vel anguste oblongum, leviter nitidulum, subtiliter pallido-pubesces, pilis squamiformibus divellendis omnino destitutum; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, sat fortiter nutante, ab antico viso fere aequae longo ac postice lato, infra oculos leviter producto, a latere viso altitudine postica paullulum longiore, clypeo basi cum fronte subconfluente, fronte nitida, vertice aequali, gula brevi, genis humilibus; oculis laevibus, a latere visis oblongis, margine interiore subrecto apicem versus divergentibus; articulo primo rostri basin capitis subattingente; antennis gracilibus, ad apicem oculorum interne incertis, articulo primo apicem clypei paullulum superante; pronoto latitudine basali circiter $\frac{2}{3}$ brevior, basi quam apice circiter duplo latiore, lateribus rectis, disco postico versus apicem sat convexo declivi; scutello basi detecto; hemielytris completis, membrana biareolata; coxis anticis medium mesosterni paullo superantibus; pedibus cum coxis totis pallidis, femoribus margine superiore puncto ante-apicali setifero instructo, posticis elongatis, tibiis nigro-spinulosis, tarsis articulo secundo tertio longiore, unguiculis aroliis destitutis; segmento maris genitali inferne mutico; terebra feminae apicem abdominis parum superante.

A genere *Phylus* HAHN, REUT. differt statura parva, paullo minus elongata, gula brevior, pronoto fortius transverso, femoribus puncto ante-apicali setifero instructis, tibiis nigro-spinulosis, segmento genitali maris inferne mutico.

Typus generis: *Phylus modestus* UHL.

Myochroocoris nov. gen.

Corpus oblongum, nitidum, omnium tenuissime pallido-pubesces; capite verticali, a supero viso valde transverso, pronoto circiter $\frac{1}{3}$ brevior ejusque basi circiter $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ angustiore, vertice modice lato, margine postico recto sat fortiter obtuse carinato, carina antice late arcuato-sinuata; capite ab antico viso fortiter transverso, infra oculos breviter producto, fronte nitida; capite a latere viso altitudine basali fere dimidio brevior, fronte fortiter declivi, convexiuscula, clypeo prominente, subperpendiculari, basi a fronte discreto, ipsa basi in