

medio altitudinis capitis posita, loris discretis, brevibus, genis humilibus (♂) vel humillimis (♂), gula haud distinguenda; oculis subtiliter granulatis, sat exsertis, a supero visis suborbicularibus, ab antico visis a medio versus apicem leviter divergentibus, a latere visis in genas longe extensis; rostro gracili, brevi, solum apicem coxarum anticarum paullo superante vel medium mesosterni attingente, articulo primo caput haud superante; antennis crassiusculis, ad (♀) vel paullulum supra (♂) apicem oculorum interne insertis, articulo primo apicem clypei attingente, secundo primo parum graciliore, sublineari (♂) vel basin versus sensim gracilescente (♀), latitudine capitis cum oculis haud (♀) vel parum (♂) longiore, duobus ultimis gracilioribus, quarto primo aequae longo; pronoto trapeziformi, marginibus omnibus subrectis, fortiter transverso, disco laevi, subhorizontali, callis discretis, valde transversis, medio distantibus; scutello pronoto aequae longo, basi detecto; hemielytris abdomen paullo superantibus, commissura clavi scutello aequae longa, lateribus subparallelis, cuneo subhorizontali, latitudine basali paullulum longiore; membrana biareolata; areola alarum hamo instructa; xypho prosterni convexo; mesosterno plano, horizontali; metastethio orificiis distinctis; coxis anticis medium mesosterni haud attingentibus; femoribus posticis quam anticis longioribus sed vix crassioribus, posterioribus marginibus fusco-punctatis, tibiis spinulis nigris e punctis fuscis nascentibus, tarsis articulo tertio duobus primis simul sumtis aequae longo, unguiculis apice breviter curvatis, aroliis cum unguiculis connexis, ultra medium eorum extensis; segmento maris genitali inferne mutico; terebra feminae medium ventris superante.

Genus capite brevi, verticali, vertice distinctissime arcuato-marginato, rostro brevi, structura antennarum etc. bene distinctum.

Myochrocoris griseolus n. sp.

Obscure fumato-griseus, margine carinato verticis, vitta angusta media marginibusque lateralibus pronoti, margine costali corii usque ad medium, sutura clavi arcuque basali cunei albido-cinereis; antennis griseis, articulo primo annuloque subbasali secundi nigricantibus, margine apicali primi imaque basi secundi sordide albidis; rostro pedibusque sordide albido-flaventibus, femoribus posterioribus punctis fuscis marginalibus signatis, tibiis spinulis sat brevibus nigris e punctis fuscis nascentibus, extremo apice tiliarum et tarsorum fusco, unguiculis nigro-fuscis; capite ab antico viso latitudinè inter apices oculorum aequae longo, vertice oculo circiter dimidio (♂) vel fere duplo (♀) latiore; pronoto basi longitudine vix duplo (♂) vel magis quam duplo (♀) latiore, apice longitudine parum (♂) vel distincte (♀) latiore. ♂♀. Long. 2 ³/₄, lat. 1 mm.

Texas, D. BOLL, 2 ♂♂, 1 ♀ (Mus. Vindob.).

Psallus ancorifer (FIEB.) — REUT., Hem. Gymn. I, 104, 3. — *Apocremnus robustus* UHL. in litt.

Sowohl Herr HEIDEMANN als Herr VAN DUZEE haben mir mehrere Exemplare einer bei Washington gefundenen *Psallus*-Art gesandt, die UHLER als neu angesehen und *Apocremnus robustus* benannt hat. Eine genaue Untersuchung dieser (♂ und ♀) hat jedoch das überraschende Resultat geliefert, dass sie mit den bekannten mediterranischen *Psallus ancorifer* FIEB. vollkommen identisch ist. Die Verbreitung dieser Art ist der schon oben besprochenen *Reuteria irrorata* (Say) sehr ähnlich und kann wohl ebenfalls nur durch Annahme einer Verbreitung über ganz Süd-Sibirien erklärt werden.