

latitudine verticis oculique unici paullo brevior, vertice oculo paullo magis quam duplo latiore; pronoto basi longitudine duplo latiore; tibiis spinulis sat longis nigris armatis. ♀. Long. $2\frac{2}{3}$, lat. $1\frac{3}{7}$ mm.

Siskiyou Co. Cal., D. O. HEIDEMANN.

Ist mir fraglich als *Strongylothes saliens* REUT. zugesandt worden.

Atractotomus albidicoxis n. sp.

Ovalis, niger, nitidulus, pilis squamiformibus albis facile divellendis dense vestitus, superne parcius breviter adpressim nigro-pilosus, rostro, antennis pedibusque totis nigris, solum coxis sordide albicantibus, articulis duobus ultimis antennarum fuscis; rostro basin coxarum posticarum attingente; antennis articulo secundo latitudine capitis (cum oculis) distincte longiore et margine basali pronoti paullo magis quam $\frac{1}{3}$ brevior, aequaliter fusiformi, breviter nigro-pubescente, articulo primo fere quadruplo longiore et hoc circiter duplo latiore, crassitie sua maxima fere quadruplo longiore, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo fere $\frac{1}{3}$ brevioribus; capite (♀) basi pronoti fere dimidio angustiore, ab antico viso latitudine verticis oculique unici fere nonnihil longiore, vertice oculo fere duplo latiore, pronoto latitudine basali circiter $\frac{3}{7}$ vel fere dimidio brevior; tibiis nigro-spinulosis. ♀. Long. 3, lat. $1\frac{2}{3}$ mm.

Chiric Mts, Ariz., d. 3 junii 1897, D. O. HEIDEMANN.

Praecedenti similis, sed major, colore coxarum, antennis longioribus capiteque minus transverso distinctus.

Strongylothes saliens REUT., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 88, 1.

Da diese Art missdeutet worden ist, ist es nötig, eine neue Beschreibung sowohl der Gattung als der Art zu geben. Auch ist das Männchen nicht früher beschrieben worden. Die Entdeckung auch dieses Geschlechts weist der Gattung ihren Platz gleich bei der Gattung *Criocoris* FIEB. an, von welcher sie sogar so wenig abweicht (nur in der Farbe und Struktur der weiblichen Fühler), dass es sehr fraglich ist, ob nicht die beiden Gattungen am besten zu vereinigen wären.

Strongylothes REUT.

Corpus oblongum (♂) vel sat breviter obovatum (♀), convexiusculum, laeve, pilis fragilibus pallidis squamiformibus vestitum; capite nutante, a supero viso pronoto parum brevior, subaequaliter triangulari, cum oculis parum exsertis apice pronoti paullulum latiore, vertice aequali, sat lato; capite ab antico viso latitudine cum oculis fere longiore (♂) vel huic aequae longo (♀), a latere viso altitudine basali vix (♂) vel paullulum (♀) brevior, clypeo praecipue maris sat compresso, cum fronte in arcum confluyente, angulo faciali acuto, genis sat altis, gula distincta, obliqua; oculis laeviusculis, pronoto contignis, a supero visis parum exsertis, rotundatis, a latere visis oblongis, in genas sat leviter extensis; rostro coxas intermedias vel (♂) apicem earum attingente, articulo primo caput parum superante; antennis ad apicem oculorum interne insertis, articulo primo brevi et crassiusculo, oculo a supero viso aequae crasso, apicem clypei vix attingente, secundo primo fere quadruplo longiore, maris fortiter incrassato, primo saltem aequae crasso, apicem versus sensim leviter gracilimente, feminae basi primo gracilior, apicem versus autem sensim sat fortiter incrassato, ultimis gracilibus; pronoto trapeziformi, transverso, margine apicali late sed sat profunde sinuato, lateribus rectis, disco versus apicem leviter declivi, callis sat discretis; hemielytris lateribus levissime (♂) vel late (♀) rotundatis, cuneo declivi, latitudini basali aequae longo (♂) vel hac bre-