

a latere viso altitudine basali paullulum brevior, clypeo et fronte in arcum subconfluentibus, clypeo levissime prominulo, basi in medio altitudinis capitis a latere visi et longe supra lineam inter bases antennarum ducendam posita, angulo faciali subrecto, loris angustis bene discretis, genis (♂) mediocribus, gula vix distingvenda; oculis parvulis, laevibus, parum prominulis; rostro gracili, coxas intermedias paullo superante, articulo primo dilatato, caput paullo superante; antennis gracilibus, ad apicem oculorum interne incertis, dimidio corpore (cum hemielytris) vix longioribus, articulo primo apicem clypei haud superante, secundo maris lineari, latitudini capitis fere aequae longo, duobus ultimis gracilioribus, simul sumtis secundo longioribus; pronoto fortiter transverso, trapeziformi, disco versus apicem omnium levissime declivi, callis distinctis, marginibus omnibus rectis, lateribus apicem versus sat leviter convergentibus, margine apicali longitudine latiore, medio levissime sinuato; scutello pronoto aequae longo, basi plerumque detecto; hemielytris explicatis, maris abdomen modice superantibus, pronoto paullo latioribus, lateribus levissime rotundatis, commissura clavi scutello paullo longiore, cuneo subhorizontali vel leviter declivi, latitudini basali aequae longo; membrana biareolata; areola alarum hamo a vena sustensa emisso, ab origine venae decurrentis paullulum remoto; xypho prosterni convexo; mesosterno plano; coxis anticis medium mesosterni superantibus; femoribus posticis utriusque sexus brevibus, incrassatis, saepe nigro-punctatis; tibiis spinulis nigris e punctis nigris nascentibus; tarsis articulis duobus ultimis longitudine subaequalibus, ungviculis versus apicem curvatis, aroliis parum distinctis.

Generi palaearctico *Aphaenophyes* REUT. affinis videtur, pronoto tamen minus brevi.

Typus: *E. stigmosa* (UHLER).

Europiella stigmosa (UHL.). — *Agalliastes stigosus* UHL., Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1893, p. 379, 32.

Von dieser Art besitze ich drei ♂♂ aus Ormsby, Co. Nev. (July, BAKER), die mit der Beschreibung UHLERS gut übereinstimmen und habe auch einen Co-Typus UHLERS aus Wasatch, Ut., von HEIDEMANN bekommen. Einige Ergänzungen mögen jedoch hier gemacht werden. Der Clypeus ist mit zwei feinen schwärzlichen Längslinien gezeichnet. Die Kopf-Zügel sind schwarzbraun. Die von UHLER erwähnte „transverse brown line“ des Pronotums sind eigentlich die beiden schwarzbraunen Schwielen. Die Schenkel sind mit schwarzen punktförmigen Flecken gesprenkelt, die an der unteren Seite der Hinterschenkel dreireihig geordnet sind. Der Kopf von vorne gesehen ist etwa so lang wie oben zwischen den Augen breit, etwa $\frac{1}{6}$ schmaler als der Hinterrand des Pronotums. Der Scheitel fast dreimal breiter als die Augen. Fühlerglied 2 so lang wie der Kopf mit den Augen breit, Glied 3 so lang wie 2, 4 halb so kurz wie 3. Das Pronotum hinten mehr als doppelt so breit wie lang, die Seitenränder etwa $\frac{2}{5}$ kürzer als der Vorderrand. Der Hinterleib schmutzig weisslich, das männliche Genitalsegment sehr gross, so lang wie der ganze übrige Hinterleib, braunschwarz. In Statu, Farbe und Zeichnung erinnert die Art ein wenig an eine kleine *Hyoidea* (*Bolteria*) *picta* (UHL.). Frische Exemplare sind oben mit weisslicher Pubescenz dicht bedeckt.

Europiella concinna n. sp.

Inferne nigra, nitida, marginibus epipleurorum pronoti, acetabulis anterioribus, limbo posteriore mesopleurorum orificiisque albido-testaceis; superne albido-testacea, nitidula, parce nigro pilosula; capite nigro, margine basali verticis testaceo, interdum etiam marginibus orbitalibus frontis pallidis; pronoto callis nigris; scutello stria subbasali, marginibusque lateralibus