

a basi usque ad medium nigro-piceis; clavo margine scutellari commisuraque, corio plaga longitudinali (interdum defficiente) discoque cunei nigricantibus; membrana fumata, venis albidis, macula ad apicem cunei hyalina; rostro fusco; antennis nigris, articulo secundo latitudini capitis cum oculis aequae longo; pedibus testaceis, femoribus serie punctorum nigricantium, basi obscuriore, tibiis spinulis nigricantibus e punctis nigris nascentibus, posterioribus apice tarsisque infuscatis; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustiore, ab antico viso latitudine cum oculis circiter $\frac{1}{3}$ brevior, vertice (♀) oculo duplo latiore; pronoto latitudine basali magis quam dimidio brevior. ♀. Long. $3\frac{1}{2}$ mm. lat. $1\frac{1}{2}$ mm.

Claremont, Cal., D. BAKER.

E. umbrinae n. sp. statura affinis, sed colore mox distincta.

Europiella umbrina n. sp.

Umbrino-fuliginosa, angulis basalibus scutelli anguste flavicantibus, margine commissurali anguli interioris corii fasciaque arcuata basali cunei albidis, membrana cum areolis fumata, venis albidis, macula inter areolam minorem et apicem cunei hyalina; antennis flavo-testaceis, articulo primo nigro-fusco, secundo latitudini capitis fere aequae longo; pedibus, coxis exceptis, lividis vel albido-flaventibus, femoribus punctis nigro-fuscis dense variegatis, tibiis spinulis nigris e punctis sat magnis nigro-fuscis nascentibus, ima basi nigra, tarsis apice articuli ultimi infuscato; capite basi pronoti paullulum angustiore, ab antico viso latitudini interoculari aequae longo, vertice oculo circiter $2\frac{2}{3}$ latiore; pronoto basi longitudine duplo latiore, marginibus lateralibus margine antico fere $\frac{2}{5}$ brevioribus; segmento maris genitali maximo, segmentis reliquis simul sumtis aequae longo, inferne mutico. ♂. Long. $2\frac{2}{3}$, lat. $1\frac{1}{3}$ mm.

Claremont, Cal., D. BAKER.

E. stigmatosa (UHL.) structura omnium partium simillima, mox autem colore valde diversa distincta.

Ist mir unter dem Namen *Melinna* (!) *biguttata* (UHL.) zugesandt worden.

Europiella rubida (UHL.). — *Sthenarus rubidus* UHL. in GILL. et BAKER, Prel. List. Hemipt. Color. 1895, p. 41.

Superne picea, nitida, pilis albis faciliter divellendis vestita, lateribus pronoti pilis nigris retrorsum vergentibus instructis; basi clavi et corii fulva, margine costali corii cuneoque ferrugineis, hoc basi haud dilutius, membrana fumata, venis fulvis; capite (♀) basi pronoti circiter $\frac{1}{5}$ angustiore, ab antico viso latitudine interoculari vix longiore, vertice ante marginem leviter depresso, feminae oculo fere $2\frac{1}{2}$ latiore, margine levissime rotundato; antennis articulo primo brevi, nigro, secundo ferrugineo, ima basi nigricante (vel toto piceo, ♂ ?), feminae latitudini verticis oculique unici aequae longo, versus apicem leviter incrassato, ultimis fuscis; pronoto basi longitudine paullo minus quam duplo latiore, basi convexiuscula, basin scutelli tegente, marginibus lateralibus margine apicali fere $\frac{2}{5}$ brevioribus, disco versus apicem leviter declivi; inferne cum coxis et femoribus rufo-picea, femoribus posticis brevibus, fortiter incrassatis, tibiis tarsisque flaventibus, illis spinulis nigris e punctis nigris nascentibus, his articulo primo apiceque tertii nigris. ♀. Long. $2\frac{3}{4}$ —3, lat. hemielytrorum $1\frac{2}{5}$ mm.

Colorado, D. BAKER (Mus. Hungar.).

Obwohl der Grund des Schildchens vom Basalrande des Pronotums bedeckt ist und die Schenkel schwarzer Punkte entbehren, scheint mir diese Art doch so eng mit den drei