

OBSERVATIONS SUR QUELQUES HÉMIPTÈRES

Et descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues

Par CL. REY.

Lopus gothicus var. **marginelis** Rey.

Cette variété intéressante a la marge latérale des élytres orangée et prolongée jusqu'à la tache du cuneus. — Dauphiné, tout près de Lyon, 1 exemplaire.

Camptobrochis lutescens var. **dubia** Rey.

Aussi répandue que le type, cette variété a les antennes moins grêles et surtout leur 2^e article plus nettement et plus largement rembruni à son extrémité. Elle fait le passage à la *punctulata*, dont elle a souvent la coloration.

Mimocoris coarctatus Rey.

La forme brachyptère ♀ de cette espèce diffère des macroptères par son prothorax étranglé en arrière avant la base et par le 2^e article des antennes à massue plus courte, plus brusque et plus noire.

Corixa atomaria var. **conglomerata** Rey.

Outre les lignes pâles du pronotum, qui sont plus étroites que les lignes noires, cette variété a les linéoles du clavus et des élytres plus ou moins anastomosées de manière à faire taches. — Montpellier, 1 exemplaire.

Quant à la *Panzeri* Fieb., c'est encore là une simple variété à taille un peu moindre, à ligne pâles du pronotum plus larges que les lignes noires, avec la carène médiane du repli des élytres plus accusée et brunâtre (1). — Provence, Languedoc.

(1) J'entends par carène médiane une carène longitudinale fine et souvent peu distincte, parcourant, dans son milieu, le large canal du repli des élytres, lequel est limité par deux autres carènes bien tranchées, l'une interne ou supérieure, l'autre externe ou inférieure.