

OBSERVATIONS SUR QUELQUES HÉMIPTÈRES

Et descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues

Par CL. REY.

Lopus gothicus var. **marginelis** Rey.

Cette variété intéressante a la marge latérale des élytres orangée et prolongée jusqu'à la tache du cuneus. — Dauphiné, tout près de Lyon, 1 exemplaire.

Camptobrochis lutescens var. **dubia** Rey.

Aussi répandue que le type, cette variété a les antennes moins grêles et surtout leur 2^e article plus nettement et plus largement rembruni à son extrémité. Elle fait le passage à la *punctulata*, dont elle a souvent la coloration.

Mimocoris coarctatus Rey.

La forme brachyptère ♀ de cette espèce diffère des macroptères par son prothorax étranglé en arrière avant la base et par le 2^e article des antennes à massue plus courte, plus brusque et plus noire.

Corixa atomaria var. **conglomerata** Rey.

Outre les lignes pâles du pronotum, qui sont plus étroites que les lignes noires, cette variété a les linéoles du clavus et des élytres plus ou moins anastomosées de manière à faire taches. — Montpellier, 1 exemplaire.

Quant à la *Panzeri* Fieb., c'est encore là une simple variété à taille un peu moindre, à ligne pâles du pronotum plus larges que les lignes noires, avec la carène médiane du repli des élytres plus accusée et brunâtre (1). — Provence, Languedoc.

(1) J'entends par carène médiane une carène longitudinale fine et souvent peu distincte, parcourant, dans son milieu, le large canal du repli des élytres, lequel est limité par deux autres carènes bien tranchées, l'une interne ou supérieure, l'autre externe ou inférieure.

Corixa infuscata Rey.

Corps suballongé, subparallèle, presque mat, brunâtre, avec la tête et les pieds testacés, le pronotum et les élytres parés de lignes transversales pâles.

Tête inclinée, testacée. Front assez convexe, avec quelques gros points enfoncés entre les bords antérieurs des yeux. Épistome à rides transversales brunes. Yeux très grands, noirs.

Pronotum court, un peu plus long que la tête vue de dessus, à hachures moins fines que celles du clavus ; presque mat, brunâtre, avec au moins 7 lignes transversales pâles, à peine moins larges que les intervalles noirs.

Écusson transverse, acuminé, d'un noir de poix.

Élytres subparallèles, subdéprimées, finement râties, presque mates, brunâtres, parées de lignes pâles très étroites, plus ou moins réunies vers le milieu du clavus, avec le sommet des cories à peine testacé ou obscurément strié de noir et le repli latéral d'un testacé obscur et parcouru par une fine carène longitudinale médiane, brune et assez accusée. Membrane coriace, presque lisse, à taches réunies et confuses.

Dessous du corps brunâtre, avec l'extrémité du ventre graduellement plus claire, et 3 grandes taches pâles sur les côtés de la poitrine, les deux antérieures contiguës.

Pieds testacés, avec les articulations parfois légèrement rembrunies, et le sommet de la palette des pieds antérieurs noir dans les deux sexes. — Long., 6 1/2 mill.

♂ Palette des tarses antérieurs simplement arquée en dessus.

Le Portugal (*Puton*).

Obs. Cette espèce, bien voisine de *transversa* par sa couleur, sa forme et sa palette noire au sommet, s'en distingue nettement par la structure de celle-ci qui, chez le ♂, est simplement arquée en dessus au lieu d'être dilatée en angle, ainsi que le représentent les deux figures ci-dessous.



transversa.



infuscata.

Sigara distans Rey.

Corps oblong, brillant, presque lisse, pâle, avec tout le disque du pronotum et de grandes taches sur les élytres d'un brun de poix.

Tête inclinée, pâle, brillante, presque lisse, offrant sur le milieu du bord postérieur du vertex un petit tubercule noir, au devant duquel une légère fossette oblongue, légèrement assombrie. Front convexe, paré en avant de 2 petites fossettes disposées en arc transversal, au devant de chacune desquelles un groupe de stries obliques, brunâtres et peu tranchées. Épistome à rides transversales noires. Yeux très grands, noirs.

Pronotum plus long que la tête, brillant, presque lisse, d'un brun grisâtre, avec tout le pourtour pâle; assez convexe; à côtés très développés au point que les yeux sont notablement distants des épaules.

Écusson transverse, triangulaire, pâle.

Élytres grandes, oblongues, légèrement arquées sur les côtés, subconvexes, brillantes, presque lisses, pâles, avec de grandes taches brunes, assez tranchées : 4 sur le clavus, les postérieures subapicales et bien moindres ; 4 irrégulières sur les cories, les antérieures subhumérales et assez grandes, les autres plus grandes, obliques, et réunies en leur milieu de manière à former, derrière la pointe du clavus, une bande transversale, fortement sinueuse. Membranes coriaces, lisses, pâles, avec une tache subapicale brune, ainsi que le bord externe.

Dessous du corps brunâtre, avec de grandes taches pâles sur les côtés de la poitrine.

Pieds grêles, très pâles.

Ardèche, La Bastide, près Notre-Dame-des-Neiges (*Guillebeau*).

Obs. Distincte de *Poweri* par sa taille un peu plus forte, par son aspect plus brillant, par la grandeur de son prothorax et par les taches du dessus du corps encore plus tranchées.

A propos de cet insecte, je crois utile de donner ici un tableau des espèces du petit genre *Sigara*.

- a. Prothorax plus court que la tête, à côtés presque annihilés au point que les yeux touchent presque aux épaules. Élytres brillantes, obsolètement pointillées, d'un testacé de poix, souvent à taches nébuleuses. Vertex avec 3 traits longitudinaux bru-