

Hemiptera L.

Heteroptera Latr.

Geocorisae Latr.

1. *Zicrona coerulea* L. Habitat in *regione sylvatica* rarissime; ad Hetta d. 25 Jul. unicum specimen inveni.
2. *Eremecoris erraticus* Fabr. Habitat per *regionem sylvaticam* freqventer.
3. *Plochiomerus sylvestris* L. Habitat in *regione sylvatica* rarissime; ad Muonioniska a Palmén d. 6 Sept. captus.
4. *Nysius Thymi* Wolff. Habitat per *regiones sylvaticam et subalpinam* freqventer.
5. *Anthocoris nemorum* L. Habitat per *regionem sylvaticam* freqventissime, *subalpinam et alpinam* freqventer.
6. *Themnostethus lucorum* Fall. Habitat in truncis Pini Abietis in *regione sylvatica* rarius; ad Kätkesuanto et Wähäniva d. 1 et 2 Sept. nonnulla specimina cepi.
7. *Piezostethus formicetorum* Bohem. (*Xylocoris formicetola* F. Sahlb.). Habitat in societate cum *Formica rufa* in *regione sylvatica* rarius; ad Muonioniska d. 18 Jun. inventus.
8. *Miris holsatus* Fabr. Habitat per *regionem sylvaticam* freqventer.
- \* 9. *Teratocoris hyperboreus* nov. spec.  
Elongatus, pallide virescens, supra glaber; antennis tenuibus, corpore longioribus, nigro-fuscis vel virescentibus; articulo primo tertio fere longiore; prothorace trapeziformi, longitudine nonnihil latiore, supra parum convexo, intra apicem et pone medium transversim obsolete impresso, postice subtiliter ruguloso; hemelytris subtilissime punctulatis, margine scutellari commissuraqve anguste nigro-fuscis. Long. ♂ 3,5; ♀ 4,5 millim.

*Mas:* minor, angustior, abdomine linearis; stylo anali in latere sinistro exerto, elongato, valde hamato-reflexo,