

Variat corpore supra nigro-fusco, unicolore.

15. *Apocremnus ambiguus* Fall. Habitat in salicetis per regionem sylvaticam frequenter, subalpinam frequentissime et alpinam rarius. Varietates pallidae semper in regione subalpina inveni.

16. *A. graminicola* Zett. Habitat in graminosis in regione subalpina rarius; prope lacum Kilpisjärvi aliquoties captus.

17. *A. intermedius* F. Sahlb. In salicetis ad cataractam Rautukurkio in regione subalpina d. 30 Aug. captus.

18. *Agallistes pulicarius* Fall. Habitat per regiones sylvaticam et subalpinam frequenter.

19. *A. saltitans* L. Ad vicum Palojoki in regione sylvatica d. 19 Jul. unicum specimen formae brachypterae inveni.

\* 20. *A. signatus* nov. sp.

Breviter ovatus, niger, opacus, pube depressa, cinerea, sat dense adpersus; fronte nitido, glabro, vertice linea transversa orbitisque oculorum pallide luteis; antennis articulo secundo apice, tertio et quarto totis obscure fuscis; femoribus apice, tibiis totis, tarsisque ferrugineis, tibiis nigro-spinulosis; prothoracis hemielytrorumque signaturis pallide luteis, plus minusve obsoletis vel evanescentibus; species dimorphis. Long. 1,5—2 millim.

*Forma macroptera*: hemielytris abdomine multo longioribus; membrana magna, completa, fusca, nervis pallidis, alis albedo-hyalinis, magnis.

*Forma brachyptera*: hemielytris abdomine parum brevioribus; membrana brevi, semiovata; alarum tantum rudimento.

*Mas*: minor, angustior, signaturis plerumque obsoletis.

*Femina*: major, latior, signaturis plerumque distinctis.

*Var. a. ♀*. prothorace linea media longitudinali et alia transversali antica, signum T formantibus, maculisque ad angulos basales, scutelli linea apicali, longitudinali, hemielytris margine laterali, corio vitta elongata prope marginem interiore ducta aliaque discoidali postice abbreviata et dilatata, maculaque transversali irregulari ante cuneum, hujus limbo