

• *Femina*: major, latior; abdomine oblongo, apice acuminato; dimorphis; *forma macroptera*: hemielytris abdomine parum longioribus; membrana completa, area apicali parteque dimidia interiori cellulae virescenti-hyalinis; alis hemielytris parum brevioribus; *forma brachyptera*: hemielytris abdomine parum brevioribus, membrana brevi; alis abdomine tertia parte brevioribus.

Var. b. ♂ capite, pronoto scutelloque linea media longitudinali, puncto ad basim tyli, annulo ad antennarum insertionem, maculis pone oculos pronotique angulis anticis nigris.

Habitat in Phragmitide communi ad littora maris albi; prope vicum Tschuja d. 27 Aug. copiose captus. (Ad littora maritima in Alandia, paroecia Pargas, insula Runsala et prope Helsingforsiam etiam haud infrequenter occurrit.)

* 80. *T. paludum* n. sp.

Lineari-elongatus, flavo-virescens, supra glaber, subtus tenuiter griseo-pubescentis; oculis mediocribus, antennis corpore multo longioribus, parte dimidia apicali articuli primi secundoque toto pulchre rufis, tertio et quarto fuscis, simul sumtis secundo longioribus; prothorace anguste trapeziformi, basi longitudine haud latiori, supra parum convexo, margine basali leviter emarginato; pedibus valde elongatis, geniculis, tarsorum basi, tibiisque posticis totis rufis, rostro apice geniculisque nigris. Long. ♂ 4, ♀ 4,5 mm.

Miris antennatus Flor. *Rhynch. Livl. I. 433. 1.* (partim).

Mas: minor, angustior; abdomine lineari, segmento genitali ad insertionem styli in latere sinistro subquadrangulater exciso, stylo valde hamato-reflexo, apice acuminato; hemielytris abdomine longioribus, membrana completa, apice hyalina.

Femina: major, latior, abdomine oblongo, apice acuminato; dimorphis; *forma macroptera*: hemielytris abdomine parum longioribus, membrana completa, area apicali parteque dimidia interiori cellulae flavo-hyalinis; alis hemielytris parum brevioribus; *forma brachyptera*: hemielytris abdomine tertia parte brevioribus, membrana brevi; alis abdominis dimidio vix longioribus.