

In territorio montoso ad Krasnojarsk et in territorio silvoso ad Jeniseisk aliquoties capta. — Europa fere tota, Sibiria orientalis. — *Mus. Holm.*

92. *M. ruficornis* FALL. — REUT. *Rev. Caps.* 7, 3. — MIRIS FALL. *Hem. Sv.* 133, 8. — H.-SFF. *Wanz. Ins.* III, 40. — *Trigonotylus ruficornis* FIEB. *Eur. Hem.* 243, 1.

In territorio montoso ad Krasnojarsk (STREBLOV) et in territorio silvoso prope vicum Sortinge ad flumen Sosva $\frac{6}{8}$ et $\frac{14}{8}$ (BERGROTH) capta. — Europa media et borealis, Sibiria orientalis. — *Mus. Holm.*

93. *Teratocoris hyperboreus* J. SAHLB. — *Not. Faun. et Fl. Fenn.* 1867, 225, 9. — REUT. *Rev. Caps.* 9, 2.

Mas: Segmento genitali ad insertionem forcipis valde hamato-reflexae fere semicirculariter exciso, lobo supra sinum postice subtruncato, angulis obtusis, subincrassato-marginatis.

Femina: segmento ultimo ventrali ad basin squamae levissime sinuato, sqvama breviter ovato-triangulari, apice rotundato; hemielytris in forma macroptera ut in mare.

Habitat in graminosis paludosis inter carices in territorio arctico et frigido a flumine Kurejka usque ad vicum Tolstoinos frequenter, feminam macropteram semel tantum inveni. — Lapponia. — *Mus. Holm.*

94. *Teratocoris Saundersi* DOUGL. et SCOTT. *Ent. Monthl. Mag.* 1869, 260, 2. — REUT. *Rev. Caps.* 11, 14. — T. Flori J. SAHLB. *Not. Faun. et Fl. Fenn.* 1870, 290, 79.

Mas: Segmento genitali ad in insertionem forcipitis hamato-reflexae in latere sinistro semicirculariter sinuato, lobo supra sinum postice valde producto acuto.

Femina: segmento ultimo ventrali fere ut in praecedenti constructo.

Prope vicum Sortinge ad Flumen Sosva in territorio silvoso $\frac{6}{8}$ et $\frac{13}{8}$ nonnulla specimina legit BERGROTH. — Europa borealis. — *Mus. Helsingf.*

95. *Leptopterna dolabrata* L. — FIEB. *Eur. Hem.* 244, 1. — REUT. *Rev. Caps.* 15, 2. — *Cimex* L. *Syst. Nat.* V, 130, 103. — *Lopus* H.-SFF. *Wanz. Ins.* fig. 261 et 262.

In territorio montoso ad Krasnojarsk (STREBLOV) et in territorio silvoso prope vicum Sortinge ad flumen Sosva $\frac{5}{8}$ (BERGROTH) sat copiose capta. — Europa tota. — *Mus. Holm.*

96. *Lopus gothicus* L. — HAHN *Wanz. Ins.* fig. 5. — FIEB. *Eur. Hem.* 266. — REUT. *Rev. Caps.* 18, 1. — *Cimex* L. *Faun. Sv.* 256, 966.

In territorio montoso ad Krasnojarsk a STREBLOV captus. — Europa tota, Sibiria orientalis. — *Mus. Holm.*

97. *Allorhinocoris*¹⁾ *flavus* n. sp. Oblongus, supra depressiusculus, flavus, nitidulus, tenuissime nigro-pubescentis, subtilissime punctulatus, antennis, rostro tarsisque apice nigricantibus; antennis elongatis, tenuibus, articulo primo pronoto vix brevior, 2:o ultimis simul sumtis brevior, prothorace deplanato, lateribus submarginatis; scutello apice subtuberculato-callosa; hemielytris in forma brachyptera membrana parva obsolete fumata; tarsi articulo primo subtus dense setoso. ♀ Long 7 m. m.

Species singularis *Plesiocori* statura haud dissimilis transitum quasi inter *Genus Pantilium* et *Calocorem* formans. — Totus luteo-flavus, tenuissime et parce nigro-pubescentis. Caput ovatum, fronte inter antennis gibboso-convexa, vertice tenuiter sulcato, genis, loris clypeoque bene discretis, gula satis longa, oculis minoribus nigricantibus, inter se quadruplo magis quam latitudine stricturae apicalis pronoti distantibus. Antennae corpore paullo longiores, tenues, tenuissime pubescentes; articulo primo vix incrassato, pronoti fere longitudine, secundo hoc vix duplo longiore et multo graciliore, ultimis capillaribus, extrorsum obsolete infuscatis, simul sumtis 2:o distincte longioribus, 3:o arcuato 4:o paullo longiore. Rostrum apicem coxarum mediarum attingens, articulo basali crasso, capitis basin attingenti, 3:o et 4:o leviter incrassatis, hoc apice piceo. Pronotum trapezoidale, basi longitudine $\frac{3}{4}$ latiore, supra deplanatum, angulis basalibus late rotundatis, lateribus obtuse marginatis, ante medium depressum, inaequale, strictura apicali annuliformi articulo primo antenarum paullo angustiore, sed quam articulo secundo distincte latiore; supra sublaeve, tenuissime nigro-pubescentis. Scutellum triangulare, laeve, convexiusculum, basi transversim impressum, apice callosa, subtuberculato. Hemielytra in forma brachyptera abdomine parum longiora, subdeplanata, extus late rotundata parce tenuissime nigro-pubescentia, obsolete punctulata; cuneo leviter exciso, margine exteriori quam basi paullo longiore; membrana parva, basi flavescendo-hyalina, apice parum fumata. Alae hyalinae, hemielytris paullo breviores. Corpus subtus flavum, unicolore, subglabrum. Pedes valde elongati, luteo-flavi, femoribus posticis abdominis apicem superantibus, tibiis brevissime nigro-spinulosis, tarsi apice nigricantibus, articulis duobus basalibus aequilongis, subtus dense setulosus.

Habitat in territorio frigido rarissime; inter Salices ad vicum Dudinka $\frac{31}{7}$ unicum specimen inveni. — *Coll. Sahlb.* Specimen in regione uralense captum in Museo Berolinensi asservatur teste O. Reuter.

98. *Calocoris Samoedorum* n. sp.

Tenuissime argenteo- et nigro-pubescentis, nigricans (♂) vel viride-flavescens (♀) supra varicolor; pedibus cum coxis flavis, femoribus praesertim posticis fusco-variegatis, tibiis nigro-spinulosis, tarsi apice infuscatis; rostro apicem coxarum posticarum attingente, apice nigro; antennis magnis, flavis, articulo primo incrassato.

¹⁾ REUT., *Pet. nouv. ent.* II, N:o 147, p. 33.