

valido, rufo-variegato, nigro-piloso, secundo apice levissime incrassato, nigricante, ultimis duobus tenuibus simul sumtis longitudine aequali; pronoto fortiter declivi convexo, strictura apicali annuliformi lata depressa; cuneo pallide flavo, apice anguste fuscescenti; membrana dilute fusca, ad apicem cunei dilutiore, venis rufescentibus.

*Mas*: Obscurior, nigro-fuscus, capite macula orbitali lineaque media frontali flavis, pronoto postice vittis 4 flavis, scutello pallide flavo, disco basali nigricante; hemielytris fuscis, obsoletissime pallido-vittatis; oculis majoribus, fronte quam strictura apicali pronoti fere triplo latiore; segmento genitali in latere sinistro leviter sinuato, margine ibidem incrassato nigro, lobo apicali leviter triangulari-producto, apice rotundato, hamo basi crasso subglobo apice reflexo, deplanato, flavo. Long. 8—8½ m.m.

*Femina*: Pallidior, flavo-virescens, litura frontali antice bifurcata genisque fuscis, pronoto lineola apicali vittisque obsoletis posticis fuscis, hemielytris obsolete rufo-vittatis; oculis minoribus, fronte quam strictura apicali pronoti fere quadruplo latiore; segmento ultimo ventrali medio profunde exciso, squama parva triangulari; secundo genitali apice utrinque obsolete sinuato. Long. 7½ m. m.

Var. b. (♂): hemielytris rufescenti-fuscis cuneo coccineo, apice anguste fusco.

Species pulchra et distincta, *C. fulvo-maculato* DE GEER affinis, sed duplo major, antennarum articulo basali valde incrassato inter congeneres jam descriptas insignis. — Corpus elongatum (♂) vel oblongum (♀), opacum, obsoletissime punctatum, undique pube tenuissima et parcissima argentea et nigra adpersum. Caput cum oculis prothoracis basi duplo angustius, convexum, laeve, loris distinctis, clypeo a fronte linea distincta separato, flavo-virescens, litura magna a vertice orta antice bifurcata lineolam pallidam includente genisque fuscis (♀), vel nigro-fuscum, macula parva orbitali intus bidentata, lineola angusta frontali foveaque antennali flavis (♂). Rostrum abdominis basin attingens, flavo-virescens, apice nigricans; articulo 1:o capitis basin superante, crassiusculo, ultimo secundo aequali et tertio distincte longiore. Oculi prominentes, nigro-brunnei. Antennae corpore parum breviores, flavo-testaceae, articulo 1:o magno et crasso, basi subito angustato, levissime curvato, rufo-vel fusco-variegato, dense et minus breviter nigropiloso, secundo hoc duplo longiore, tenui, apicem versus levissime incrassato, uti apicalibus tenuissime pubescenti, pallide flavo, apicem versus sensim rufescenti, fusco et nigricante; tertio et quarto tenuibus, totis flavis, simul sumtis secundo paullo brevioribus, ultimo penultimo distincte brevioribus. Pronotum longitudine ⅓ latius, apicem versus coarctatum et declive, ante medium transversim impressum, disco postico convexo, strictura apicali lata, depressa; supra sublaeve, pube tenuissima depressa argentea tecta; griseo-flavescens, latera versus rufescens, lineola media apicali angulisque omnibus anguste fusco-nigricantibus, postice late sed obsolete rufo-vittatum (♀) vel fuscum, vittis quattuor distinctis antice abbreviatis flavis (♂). Scutellum triangulare, latitudine paullo longius, pallide flavum, parte basali a pronoto tecta semper, discoque medio in ♂ nigricantibus. Hemielytra abdomine ⅓ (♀) vel dimidio (♂) longiora, corio subtilissime punctulato, tenuissime argenteo- et fusco-pubescentia, flavo-virescentia, venis clavi et corii vittisque indeterminatis obsoletis rufo-ferrugineis, macula obsoleta ante basin cunei fusca (♀), vel fusca, vittis clavi et corio obsoletis pallidioribus (♂); cuneo latitudine basali distincte longiore, pallide flavo, apice rufescenti vel nigro-fusco. Membrana dilute fusca, area parva cum macula ad apicem cunei conjuncta hyalina, venis sanguineis. Corpus subtus tenuiter pubescens, vel totum virescenti flavum (♀) vel fuscum proet metasterno medio coxisque lucide flavis (♂). Pedes valde elongati, apicem abdominis attingentes (♀) vel superantes (♂), pallide flavi, femoribus praesertim posticis brunneo-vel fusco-punctatis, tibiis spinulis nigris et punctis parvis nigris nascentibus armatis, tarsis apice nigricantibus, articulo basali secundo fere brevioribus, subtus haud tomentoso.

Habitat in graminosis inter Salices in territorio arctico et frigido rarissime; ad vicum Potapovskoja 25/7 (TRYBOM) prope vicum Dudinka 2/8—4/8 (TRYBOM et auctor). — *Mus. Holm., Coll. Reut., Coll. Hagl. et Coll. Sahlb.*

99. *Calocoris fulvo-maculatus* DE GEER. — FIEB. *Eur. Hem.* 253, 5. — REUT. *Rev. Caps.* 33, 4. — *Cimeæ* DE GEER *Mem. d. Ins.* III, 294, 33. — *Capsus* H.-SEF. *Wanz. Ins.* III, 50 f. 267.

In territorio arctico rarius occurit. — Europa tota, Kamtschatka. — *Mus. Holm.*

100. *Calocoris nigriceps* n. sp.

Oblongus, nigricans, parce tenuissime aureo-pubescenti, prothorace, scutello hemielytrisque lurido-flavis, cuneo flavo-albido, basi et apice plus minusve late nigro-fuscis; antennis nigricantibus, articulo secundo prope basin late, 3:o 4:oque basi pallide flavis; rostro articulo primo excepto, tibiis apice excepto tarsisque flavis, illis nigro-spinulosis, pectore utrinque prope coxas posticas macula alba notata; clypeo basi impressione obsoleta a fronte discreto, antennarum scapo crasso, apicem versus dilatato, secundo hoc 2¼ longiore, ultimis duobus tenuibus simul sumtis distincte brevioribus, 3:o 4:o fere 2/3 longiore; pronoto strictura apicali tenui, disco postico subtiliter minus dense punctato; scutello medio convexo transversim obsoletissime strigoso; membrana fumata, venis crassis, fuscis. Long. 8—8½ m. m.

*Mas*: Oculis majoribus, fronte quam strictura apicali pronoti quintuplo latiore; segmento genitali flavo-variegato subtus linea pallida notata, in latere sinistro angulariter exciso, incisura antice dente acuto terminata, margine incrassato, lobo apicali triangulari apice anguste rotundato, hamo basi crasso, apice hamato-inflexo.