

Larvas in territorio montoso et silvoso m. Junio frequenter vidi, imagines formae brachypterae in territorio arctico prope ostium fluminis Kurejka ¹⁹/₇ legit TRYBOM. — Karelia rossica, Rossia media, Sibiria orientalis. — *Mus. Holm.*

*128. **Dicyphus Stachydis** REUT. — *Capsus collaris f. brach.* FLOR. *Rhynch. Livl. I, 483, 9.* — *Dicyphus pallicornis f. brach.* SAUND. *Trans. ent. soc. 1875, 285, 3. (verisimiliter).* —

Differt a *D. errante* WOLFF, antennis multo brevioribus et ad genus *Brachycerea* FIEBERI referendus et verisimiliter *D. (Br.) pallicorni* FIEB. proximus, sed differre videtur colore antennarum, signaturis, spinulis tibiaram longioribus et pubescentia hemielytrorum.

Prope vicum Kolmogorovo in territorio silvoso ³/₁₀ duo specimina formae brachypterae (♂ et ♀) legit TRYBOM. — Livonia, Dania, Scotia. — *Mus. Holm.*

*129. **Orthotylus virens** FALL. — REUT. *Rev. Caps. 131, 3.* — *Capsus* FALL. *Hem. Sv. 122, 13.* — KIRSCHB. *Rh. Wiesb. 76, 89.*

In territorio silvoso prope vicum Sortinge ad flumen Sosva ¹⁴/₈ unicum specimen (♀) invenit BERGROTH. — Scandinavia, Fennia, Rossia. — *Mus. Helsingf.*

*130. **Orthotylus discolor n. sp.**

Nigro-pilosus, parum nitidus, vertice marginato, cuneo et venis membranae corio concoloribus, callis pronoti satis distinctis, tibiis nigro-spinulosis; mas et femina colore dissimiles.

Mas: Elongatus, nigricans. antennis extrorsum pedibusque sordide flavescens, hemielytris abdomine ³/₄ longioribus, griseo-flavescens, clavo circa scutellum infuscato, membrana explicata, fumata, venis pallide flavis: antennis crassiusculis, longioribus; segmento genitali sinistrorsum profunde sinuato, forcipe exserto pallide flavo, apice lamellato-dilatato. Long. 4 m.m.

Femina: Oblonga, albido-flavescens, antennis brevioribus, rostro tarsisque apice infuscatis, hemielytris abdomine parvarum brevioribus, totis albido-flavis; membrana parva hyalina, metallice nitente, venis cellulisque pallide flavescens; segmento ultimo ventrali medio utrinque acute exciso, squama elongato-triangulari, apice anguste rotundato, segmento secundo genitali lateribus utrinque late leviter sinuato. Long. $3\frac{1}{3}$ — $3\frac{1}{2}$ m. m.

Species dissimilitudine sexuum inter congeneres insignis generi *Cyrtorhino* et *Tragiscocori* approximans, sed structura pronoti diversa. — *Mas:* subcaerulescenti-nigricans, dense et satis longe nigro-pilosus. Caput breviter triangulare, convexum, nigrum, vertice satis distincte marginato, tylo basi, loris genisque bene discretis; nigrum, vertice obsolete piceo. Rostrum coxas posticas attingens, lividum, apice piceum, articulo primo valde incrassato, medium mucronis prosterni attingente. Antennae crassiusculae abdominis apicem attingentes, nigrae, apicem versus picescentes, articulo primo capitis apicem superante, obsolete clavato, setis nonnullis nigris instructo, secundo hoc fere triplo longiore, apicem versus obsolete incrassato, tenuissime pubescenti, tertio tenui praecedenti ¹/₆ brevior, ultimo penultimo fere triplo brevior. Pronotum basi longitudine duplo latius, apicem versus fortiter angustatum, lateribus obsolete sinuatis, apice leviter emarginato, tenuissime marginatum, basi medio obsolete emarginato, angulis oblique rotundatis; supra convexusculum, callis anterioribus magnis transversim ovalibus, caesio-nigrum, nitidum, satis dense et longe nigro-pilosum. Scutellum triangulare prothorace paulo brevius, prope basin transversim impressum, uti prothorax coloratum et pubescens. Hemielytra elongata, abdomine ³/₄ longiora, pallide griseo-flavescens, nigro-pilosa, intus plus minusve late nigricantia, cuneo latitudine paulo longiore, membrana sordide hyalina, venis areisque basalibus flavescens. Alae hyalinae, area discoidali hamis destituta. Corpus fuscum, griseo-pubescenti. Pedes elongati, sordide flavi, nigro-setosi, femoribus infuscatis, tibiis nigro-spinulosis, tarsi apice infuscatis. *Femina* differt colore totius corporis pallide griseo-flavo, segmentis abdominalibus praesertim posterioribus medio infuscatis; antennis brevioribus et tenuioribus, articulo primo apicem clypei vix attingente, 3:0 4:0 duplo longiore, pronoto basi minus lato, apice sub parte antica valde convexa vix visibiliter marginato; hemielytris brevioribus, extus leviter rotundatis.

Nympha: pallide flava, glabra, abdomine virescenti, pronoto brevissimo, subrectangulari, convexo, antennis articulo tertio secundo aequali, rostro tarsisque apice piceis.

Habitat in plantis ruderalibus in territorio arctico et frigido ad flumen Jenisej passim copiose; ad vicos Chantaika, Dudinka et Tolstoinos m. Julio Sept. captus. — *Mus. Holm., Coll. Reut., Coll. Hagl., Coll. Sahlb.*

*131. **Orthotylus Artemisiae n. sp.**

Pallide virescens, breviter nigro-pilosus, antennis pedibusque pallide flavis; tibiis nigro-spinulosis, vertice marginato; antennarum articulo secundo ultimis duobus simul sumtis aequali, ultimo penultimo duplo brevior; rostro coxas intermedias attingente, apice piceo; callis pronoti magnis distinctis; membrana fusco-hyalina, venis flavis.

Mas: hemielytris abdomine ²/₃ longioribus, membrana magna, segmento genitali in latere sinistro levissime sinuato; forcipe dextro apice appendiculo tenui acuto armato. Long. $5\frac{1}{2}$ —6 m.m.

Femina: hemielytris abdomine parum longioribus; membrana parva; segmento secundo genitali lateribus utrinque vix sinuato, squama triangulari, apice late rotundato; crypto-dimorpha.

Forma brachyptera: hemielytris abdomine brevioribus, membrana parva sutura clavi duplo brevior.