

**Theraneis** SPIN.1. *T. limbatipectus* STÅL.

Fusco-brunnescens, subtus ferruginea, albido-sericea, antennis, rostro pedibusque nigricantibus; thorace et prostethio posterius limboque costali hemelytrorum ventrisque flavo-albidis. ♂. Long. 14, Lat. 4 Millim. — (Mus. Holm.).

2. *T. vittata* SPIN.

Essai sur les Hém. p. 181. (Mus. Holm. et STÅL.).

3. *T. incisa* H. SCH.

Wanz. Ins. IX. p. 182. fig. 981. (Mus. Holm. et STÅL.).

**Acinocoris** HAHN.1. *A. calidus* HAHN.

Wanz. Ins. II. p. 114. fig. 194. (Mus. Holm. et STÅL.).

## CAPSINI BURM.

**Miris** FABR.1. *M. insuavis* STÅL.

Elongatus, pallide griseo-flavescens, thorace posterius, scutello pedibusque pallide sordide viréscentibus; antennis vittaque obsoleta interna corii fusco-testaceis; femoribus posticis apicem versus sensim paullulum gracilioribus. Long. 10, Lat. 2 Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

*M. erratico* inter nostrates subsimilis, capite brevior antennis gracilioribus. Caput cum oculis longitudine fere latius. Antennæ graciles, articulo 1 thorace nonnihil brevior, 2 illo 2½ longior. Thorax latitudini posticæ subæquilongus, antice quam postice dimidio angustior, utrimque leviter sinuatus, subtiliter punctatus. Femora postica inermia, apicem versus nonnihil graciliora.

**Lopus** HAHN.1. *L. Hahni* STÅL.

Oblongus, supra fuscus vel flavo-testaceus, subtus cum pedibus sordide flavo-albidus; antennarum articulis 1 et 2 rufo-testaceis, hoc saepe apice fusco, reliquis nigro-fuscis, 3 ultra medium albido; thorace scutelloque rugoso-punctatis, illo utrimque anguste obscurius marginato, maculis 2 mox ante medium parvis approximatis scutellique apice flavo-albidis; membrana vinacea. ♂. Long. 9½, Lat. 3½ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

*Lopo tunicato* haud dissimilis, latior, articulo basali antennarum capiti æquilongo, secundo illo ter fere longiore, ambobus apicem versus leviter incrassatis; margine thoracis basali angustissime sordide albido; scutello convexo.

2. *L. rufinasus* STÅL.

Oblongus, dilute testaceo-flavescens, subtus cum pedibus nonnihil pallidior; capite apice, annulo subapicali femorum, apicibus tibiarum, antennarumque articulis 1 et 2 rufescentibus; thorace evidenter punctato, latera versus sordide subsanguineo. ♀. Long. 6½, Lat. 2 Millim. — (Mus. Holm.).

Antennarum articulo 1 capitis latitudini intraoculari subæquilongus, 2 illo ter longior, apicem versus sensim nonnihil incrassatus. Thorax postice quam antice vix ter latior, lateribus vix sinuatus.