

3. *L. sulcaticornis* STÅL.

Supra fusco-cinnamomeus, parce sericeus, thorace dilutiore, subtus cum pedibus dilute testaceo-flavescens; antennis crassis, articulo 2 rufo-testaceo, utrimque sulcato, 3 ultra medium flavescens; membrana fusca, rufescente-venosa, ad apicem appendicis macula parva flavo-albida ornata. ♂. Long. 8½, Lat. 2½ Millim. — (Mus. STÅL.).

Subelongatus. Caput latitudini subæquolongum. Thorax longitudini fere æquilatus, posterius quam antice plus duplo latior, utrimque apicem versus levissime sinuatus. Antennæ articulo 1 capite nonnihil longiore, crasso, basin versus nonnihil graciliore, fusco-testaceo, 2 illo vix ter longiore, crasso, compresso, utrimque sulcato, obscure rufo-testaceo, 3 et 4 gracilioribus, nigris, subæquilongis, basali nonnihil brevioribus, illo ultra medium, hoc basi ipsa albidis.

Resthenia SPIN.1. *R. pyrrhula* BURM.

Phytocoris id *Burm.* Handb. der Ent. II. p. 271. 19. (Mus. Holm. et STÅL.).

2. *R. nigripennis* STÅL.

Coccinea, pilosula; antennis, lobo medio capitis, scutello hemelytris pedibusque nigricantibus. ♂. Long. 8, Lat. 3½ Millim. — (Mus. Holm.).

Antennarum articulo 1 capite supra viso vix duplo longior, 2 illo 2½ longior, æquicrassus.

3. *R. seminigra* STÅL.

Lutescens; antennis, hemelytris, meso- et metastethio abdomineque nigricantibus. ♀. Long. 8½, Lat. 2½ Millim. — (Mus. STÅL.).

Præcedenti valde similis, antennis gracilioribus, articulo basali longiore, thoraci fere æquilongus, 2 illo vix duplo longiore, graciliore.

4. *R. Zetterstedti* STÅL.

Nigricans, subsericea; articulo basali antennarum basi obsolete testaceo-flavo-annulato; femorum posticorum dimidio basali (basi ipsa tamen excepta) flavo-albido. ♀. Long. 7, Lat. 2½ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

Articulus basalis antennarum thoraci vix æquilongus, 2 illo nonnihil gracilior, fere plus dimidio longior.

5. *R. pyrrhomelæna* STÅL.

Lutescens vel cinnabarina; antennis, capite, hemelytris, pedibus abdomineque nigricantibus; femorum posticorum dimidio basali (basi ipsa excepta) flavo-albido; annulo obsolete articuli basalis antennarum testaceo-flavo. ♂. ♀. Long. 7, Lat. 2½ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

Statura omnino præcedentis, cujus forte varietas, colore tantum discrepans.

6. *R. luteipes* STÅL.

Nigricans, annulo obsolete basali antennarum testaceo-flavo; pedibus lutescentibus, geniculis, tibiaram apicibus tarsisque nigricantibus vel nigro-fuscis, dimidio basali femorum posticorum albido. ♀. Long. 7, Lat. 2½ Millim. — (Mus. Holm.).

Statura præcedentium, cujus forte varietas.

7. *R. flavo-nigra* STÅL.

Flavescens, capite supra, antennis, vitta latissima thoracis anterie subito angulato-dilatata, scutello, hemelytris pedibusque nigricantibus; ano maculaque utrimque parva pectoris prope coxas anticas fuscis. ♂. Long. 7, Lat. 2½ Millim. — (Mus. Holm.).