

2. *P. effictus* STÅL.

Pallide flavo-albidus, acervatim fusco-irroratus et indutus; antennis (articulo 1 excepto) dilute fuscis, apicem versus nonnihil obscurioribus, 2 et 3 basi ipsa albidis, thorace vittis 5 obsoletis minus dense fusco-irroratis, intra marginem basalem linea nigro-fusca; corio hic illic dilutiore; membrana dilutissime fusco-adspersa. ♀. Long. 5, Lat. $1\frac{2}{3}$ Millim. — (Mus. Holm.).

P. populi subsimilis, multo minor. Antennæ articulo 1 pallido, fusco-consperso, thoraci fere æquilongus, reliquis fuscis, 2 et 3 basi albidis, 2 basali duplo longiore. Oculi majusculi. Thorax longitudine duplo, postice quam antice plus duplo latior, utrimque vix sinuatus, margine basali excepto dense fusco-adspersus, vittis 5 obsoletis minus dense adpersis, linea basali intramarginali nigro-fusca. Scutellum pone medium lineis 2 nigro-fuscis, a disco oblique retrorsum currentibus. Hemelytra dilute fusco-adspersa, margine costali obscurius fusco-punctato, corio basi, apice et medio dilutiore; appendicis apicali hic illic fusco-sanguineo adpersis; membrana pallide confluentur fusco-conspersa. Subtus obscurior, late fusco-limbatus. Pedes pallidi, femoribus (basi excepta) tibiisque fusco-adspersis, hic illic subannulatis.

Deræocoris KIRSCHB.1. *D. nobilitatus* STÅL.

Oblongus, impunctatus, supra cum antennis nigro-fuscus, subtus cum pedibus, macula anteriore thoracis, scutello (apice excepto), maculis plurimis minutis in hemelytrorum parte dimidia basali, fasciaque valde obliqua corii appendicisque communi flavescens; femoribus apicem versus articuloque basali antennarum subtetaceis, articulis horum 3 et 4 basi albidis, membrana fusca. ♂. Long. 7, Lat. $2\frac{1}{2}$ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

Statura *D. atri*. Articulus basalis antennarum capiti vix æquilongus, 2 illo duplo fere longior, apicem versus sensim nonnihil incrassatus.

2. *D. Wallengreni* STÅL.

Oblongus, impunctatus, lutescens, antennis, thoracis macula parva media basali, hemelytris abdomineque nigricantibus, marginibus lateralibus scutelli, commisura lineaque ante medium intracostali hemelytrorum flavis; basi articuli 3 antennarum albido. ♀. Long. 7, Lat. $2\frac{1}{2}$ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

Species pulcherrima, statura præcedentis. Articulus basalis antennarum capiti vix æquilongus, 2 illo duplo longior, apicem versus sensim nonnihil incrassatus, et compressus.

Variat abdomine hemelytris fusco-testaceis, appendice rufescente.

3. *D. cribricollis* STÅL.

Elongato-oblongus, scutello thoraceque dense, sat rude punctatis; supra nigro-fuscus, subtus cum apice articuli 2 antennarum, capite, thoracis vittis 3 latis, scutelli marginibus lateralibus, sutura clavi, vena intra-costali, maculis 2 oblongis corii venisque membranæ pallide griseo-flavescentibus; membrana fuscescente, macula exteriori vittaque multo dilutioribus; tibiis basi, apice annuloque medio fuscis. ♀. Long. $7\frac{1}{2}$, Lat. $2\frac{1}{2}$ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

Antennarum articulus basalis thorace parum brevior, 2 illo $\frac{1}{2}$ longior, et nonnihil gracilior.

4. *D. vittiscutis* STÅL.

Oblongus, dilute subolivaceo-virescens, nitidus, punctulatus, subtus dilutior; antennis nigro-fuscis, articulo 3 basi albido; vitta scutelli, limbo clavi, linea intracostali corii, angulis apicali et interno appendicis venisque membranæ nigro-fuscis. ♀. Long. 5, Lat. 2 Millim. — (Mus. Holm.).