

apicem versus leviter incrassato, 3 basali nonnihil brevior. Thorax postice quam antice fere plus ter latior, latitudine antica plus duplo longior, lateribus rectis. Membrana basi et medio fuscescens. Pedes parce fusco-adspersi; tarsis apice nigro-fuscis. Venter transversim, latera versus etiam sublongitrorsum fusco-lineolatus.

19. *D. Dahlbomi* STÅL.

Oblongus, valde obscure fusco-testaceus, nitidus, remote punctatus, pilosulus; margine costali corii dilatato, margine externo appendicis, maculaque parva membranæ ad apicem appendicis sordide albidis; pedibus pallide flavescentibus; membrana fuscescente, obscurius venosa; antennis compressis. ♀. Long. 5, Lat. vix $2\frac{1}{2}$ Millim. — (Mus. Holm.).

Antennarum articulus basalis crassus, capiti subæquilongus, 2 illo vix ter longior, compressus, latus.

20. *D. dilatatus* STÅL.

Oblongus, pallide testaceo-flavescens, nitidus; pilosulus, supra totus sat dense punctatus; oculis admodum magnis; margine costali hemelytrorum dilatato, pallido; margine apicali appendicis venisque membranæ subsanguineis. ♂. Long. 6, Lat. 3 Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

Caput latitudine (cum oculis) nonnihil brevius. Antennæ articulo basali crasso, apicem versus sensim nonnihil graciliore, basi subconstricto, capiti subæquilongus, 2 illo ter longiore vel ultra, graciliore, 3 et 4 brevibus, ad unum basali vix æquilongis. Thorax dense et hemelytris multo evidentius punctatus. Margo hemelytrorum costalis dilatatus basin versus nonnihil latior.

21. *D. fraudans* STÅL.

Oblongus, pallide testaceo-flavescens, nitidus, (pilosulus?); oculis mediocribus; thorace remote, evidenter, hemelytris densius obsolete punctatis, margine costali dilatato, subparallelo, margine scutellari clavi, commisura, margine apicali corii basique appendicis subsanguineis; thorace postice intra marginem fusco. ♀. Long. $5\frac{1}{2}$, Lat. $2\frac{3}{4}$ Millim. — (Mus. Holm.).

Præcedenti valde affinis, thorace subtilius multo minus dense punctato, articulo basali antennarum graciliore, secundo illo duplo tantum longiore, oculis minoribus differt.

22. *D. basicornis* STÅL.

Subelongatus, pallide flavescens, opacus, puberulus; antennarum articulo basali toto, 2 apice nigro-fuscis. ♀. Long. 4, Lat. 1 Millim. — (Mus. Holm.).

Statura *Capsi nubili* (H. Sch.) et ei similis. Articulus basalis antennarum capitis latitudine intraocularem vix longior, 2 illo duplo longior, gracilior, 3 secundo, 4 basali nonnihil longiores, graciliores.

23. *D. cincticornis* STÅL.

Elongatus, fusco-testaceus, capite callisque 2 anticis valde approximatis thoracis dilutioribus; antennis pedibusque albedo-flavescentibus, annulo medio illarum articuli basalis, basi et annulo subapicali articuli secundi articulisque 2 apicalibus totis nigro-fuscis; hemelytris fuscis, membrana nonnihil dilutior, appendicis apice obscuriore. ♀. Long. $3\frac{1}{4}$, Lat. $\frac{3}{4}$ Millim. — (Mus. Holm.).

C. annulati primo intuitu similis. Antennæ corpore ipso $\frac{1}{4}$ breviores, articulo basali capitis latitudini intraocularem fere æquilongus, 2 illo duplo longiore, 3 secundo, 4 basali paululum longioribus.

24. *D. vitreus* STÅL.

Anguste oblongus, nigricans, nitidus, dense evidenter punctatus; capite, antennis, annulo calloso antico et margine basali thoracis pedibusque anterioribus flavo-albidis; he-