

fusco-testaceis, horum margine costali sordide flavo-albido; membrana fuscescente. ♂. Long. 5, Lat.  $1\frac{1}{2}$  Millim. — (Mus. STÅL.).

Antennæ corpore plus dimidio longiores, articulo basali capite cum thorace parum brevior, æquali, 2 illo  $\frac{1}{2}$  longiore, crassiore, basin versus gracilescente, 3 et 4 setaceis, illo basali nonnihil longiore, hoc basali subæquilongo. Thorax antice quam postice dimidio angustior, latitudine antica nonnihil longior, lateribus levissime subsinuatis.

### 2. *C. quadristillatus* STÅL.

Subelongatus, parallelus, nigricans vel obscure fusco-testaceus, opacus; antennarum articulo basali apice testaceo, 2 apicem versus flavo-albido; hemelytris nigro-fuscis, macula transversa corii ante medium albida, parte basali appendicis luteo-albida; membrana fuscescente; femoribus obscure testaceis, tibiis tarsisque flavo-testaceis. ♀. Long.  $4\frac{1}{2}$ , Lat.  $1\frac{1}{2}$  Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

Caput thorace paullulum longius, conico-productum. Antennæ articulo basali capitis latitudini æquilongo, 2 illo vix duplo longiore, subæquicrasso, basin versus paullulum graciliore, 3 basali vix longiore. Thorax latitudine antica vix vel paullulum longior, sed postice plus duplo latior, utrimque leviter sinuatus, angulis posticis productis, anterieus callis 2 confluentibus, non nisi per sulciculum separatis, instructus.

### 3. *C. bis-bistillatus* STÅL.

Nigricans, subopacus, subelongatus, parallelus; antennis corpori fere æquilongis, articulo basali toto, 2 basi testaceis, hoc apice albido; corii fascia ante medium albida, appendicis parte dimidia basali luteo-albida; membrana pallide fuscescente; pedibus flavo-testaceis, coxis sordide albidis. Long.  $3\frac{3}{4}$ , Lat. vix 1 Millim. — (Mus. Holm.).

Præcedenti valde affinis, minor, subnitidus, antennis nonnihil longioribus, coloreque coxarum differt.

### 4. *C. stillatipennis* STÅL.

Subelongatus, nigricans, opacus, sordide albido-subsquamosus; apice articuli secundi antennarum, macula parva basali media thoracis, macula utrimque parva basali apiceque ipso scutelli, macula basali appendicis, coxis, basi femorum, tibiis tarsisque testaceo-flavis; fascia corii ante medium albida; femoribus (basi excepta) fusco-testaceis. ♂. Long.  $2\frac{3}{4}$ , Lat. vix 1 Millim. — (Mus. Holm.).

Præcedentibus similis, sed multo minor. Antennæ crassiores, articulo basali capitis latitudine nonnihil brevior, 2 illo vix duplo longiore. Hemelytra nigro-fusca, membrana fuscescente.

### 5. *C. sanguiniceps* STÅL.

Elongatus, parallelus, pallide flavo-albidus, supra in colorem pallide virescentem vergens; capite thoraceque antico dilute sanguineis; antennarum articulo basali toto, 2 apice nigricantibus. Long.  $3\frac{1}{2}$ , Lat. vix 1 Millim. — (Mus. Holm.).

Statura fere *Capsi nubili* (H. Sch.). Caput anterieus subdeclivum, parum productum, thorace antico parum latius. Antennæ corpore cum hemelytris fere longiores, graciles, articulo basali thoraci fere æquilongo, 2 illo vix duplo longiore, graciliore. Thorax postice quam antice plus duplo, fere ter latior, latitudine antica nonnihil longior, anterieus callo transverso subobsoleto instructus.

### 6. *C. Costæ* STÅL.

Subelongatus, niger, nitidus, sat dense et evidenter punctatus, articulo basali antennarum, capitis parte antica et linea utrimque ad oculos, rostro pedibusque flavo-albidis, membrana fuscescente. ♂. Long.  $3\frac{1}{4}$ , Lat. 1 Millim. — (Mus. STÅL.).

Caput thorace antico multo latius, declivum, oculis prominentibus. Antennarum articulus basalis capitis latitudine intraoculari nonnihil longior, 2 illo fere duplo longior, gracilis, puberulus. Thorax anterieus quam postice