

8. *E. Crux nigra* STÅL.

Oblongus, subsordide albido-flavus, antennarum articulis 1 et 2 (basi ipsa excepta), scutello, clavo, corio pone medium, membrana, femorum apicibus, tibiis abdomineque nigricantibus aut nigro-fuscis. ♀. Long. 4 Lat. vix 2 Millim. — (Mus. Holm.).

9. *E. Fairmairei* STÅL.

Oblongus, niger, nitidus, puberulus; antennarum articulis 1 et 2 crassis, apicalibus setaceis, 3 basi albido; corio appendiceque sanguineis; membrana fuscescente, apice subdecolore; femoribus tarsisque flavo-testaceis, illorum basi tibiisque fusco-testaceis. ♂. Long. 4, Lat. 1½ Millim. — (Mus. Holm.).

10. *E. venustus* STÅL.

Oblongus, niger, opacus, dense crebre profunde punctatus, albido-sericeus; antennis, rostro, macula marginali apicali corii, appendice pedibusque albidis; membrana decolore, angulo basali venaque dilute fuscescentibus; capitis apice albido-testaceo. ♂. Long. 4, Lat. 2 Millim. — (Mus. Holm.).

Articulus basalis antennarum capitis latitudine intraoculari paullulum longior.

11. *E. leucopus* STÅL.

Oblongus, niger, opacus, dense et fortiter punctatus, albido-sericeus; antennis, rostro, pedibus, maculis 2 marginalibus corii, una prope basin, altera subapicali albidis; appendice membranaque decoloribus, hujus vena fuscescente. ♀. Long. 3½, Lat. 1¼ Millim. — (Mus. Holm.).

Præcedenti similis, articulo basali antennarum capitis latitudini intraoculari vix æquilongus.

12. *E. discipennis* STÅL.

Oblongus, nigricans, opacus, dense evidenter punctatus, albido-sericeus; antennis, rostro, pedibus, abdomine hemelytrisque albidis, clavo (macula media ad suturam excepta) fasciaque corii prope apicem, intus latiore, nigro-fuscis; capite flavo-albido. ♂. Long. 4, Lat. 1½ Millim. — (Mus. Holm.).

13. *E. hyalinus* STÅL.

Oblongus, albido-flavus, opacus, dense evidenter punctatus, subsericeus; antennis apicem versus fuscis; subtus cum pedibus hemelytrisque albidus, angulis posticis thoracis, scutello, clavi basi, commisura fasciaque pone medium corii nigro-fuscis. ♂. Long. 5, Lat. 2½ Millim. — (Mus. Holm.).

14. *E. longulus* STÅL.

Elongatus, subparallelus, nigricans, dense evidenter punctatus, nitidus; antennis, pedibus hemelytrisque testaceo-flavis, illarum articulo 2 apice nigro-fusco; clavo, macula maxima oblonga corii ad commisuram membranaque fuscis. ♂. Long. 4, Lat. 1¼ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

B. *Caput antrorsum conico-productum.*15. *E. niger* STÅL.

Anguste oblongus, niger, nitidus, evidenter punctulatus; antennarum articulis 2 et 3 basi, rostro, femoribus tarsisque ultra medium tibiisque (basi apiceque exceptis) albidis; membranæ parte basali fuscescente. ♀. Long. 4½, Lat. 2 Millim. — (Mus. Holm.).

Specimen e Remedios Columbæ etiam domum misit Dom. NISSER.