

**Zoologie**

**Yeni bir *Oncotylus viridiflavus longipes*  
spesiesi (Hem. Heteropt. Miridae)**

***Oncotylus viridiflavus longipes* nov. Subspec.  
(Hem. Heteropt. Miridae)**

von Eduard WAGNER  
(Hamburg)

*Özet : Maraş ve İskenderundan toplanan materyel arasında nominat türe nazaran başka türlü, görünen bilhassa açık renkleri ve daha uzun ekstremiteleri ile göze çarpan fertler vardır. Her ne kadar bunlar kendi aralarında müstakil bir tür teşkil ediyorlarmış gibi görünüyorsa da, etraflı bir araştırma neticesinde bu farkların yalnız renk ve bir derece farkı oldukları tesbit edildiğinden bu fert topluluğunu coğrafik bir ırk olarak kabul etmek yerinde olur.*

\*  
\* \*

Grundfarbe gelblichgrün, mit abstehenden, langen, borstenartigen Haaren. Die schwarze Zeichnung der Oberseite stark verringert aber sonst wie bei der Nominatrasse. Beine und Fühler auffallend lang. Gestalt schlank, beim ♂ 5,0x, beim ♀ 4,3x so lang wie das Pronotum hinten breit ist.

K o p f kurz und breit, wie bei der Nominatrasse gezeichnet, die Flecke jedoch kleiner. Scheitel beim ♂ 1,5x, beim ♀ 2,35x: so breit wie das grösstenteils schwarzbraune Auge. Fühler sehr lang, ihre Gesamtlänge beträgt beim ♂ 88%, beim ♀ 86% der Körperlänge samt Halbdecken; 1. Glied so lang wie der Kopf samt Augen breit ist, vor der Spitze innen 2 schwarze Punkte, das Ende schwarz; 2. Glied beim ♂ 2,36x, beim ♀ 2,24x so lang wie der Kopf breit ist, distal dunkler; 3. Glied beim ♂ 2,1x, beim ♀ 1,8x so lang wie der Kopf breit ist, dünn, schwarzbraun; 4. Glied 0,35-0,36x so lang wie das 3.

P r o n o t u m trapezförmig, Schwielen stark gewölbt, hinten schwarz gesäumt; Hinterecken und 2 Querstreifen in der Mitte des Hinterrandes schwarz. Scutellum ungefleckt, nur hinter der Querfurche jederseits ein keilförmiger schwarzer Fleck Halbdecken fein schwarz behaart, durchscheinend, an den Adern heller. Membran hell rauchragu, Adern weisslich.