

*in disco et ante marginem posticum pronoti, macula geminata ad basin scutelli, dimidioque apicali femorum posteriorum plus minus brunneo-vel rufo-fuscis; apicibus rostri scutellique fusco-nigris; antennarum articulo 3° ad apicem et articulo 4° toto, apice imo tibiaram anticarum, apicibusque tarsorum omnium pallide fusco-brunneis; capite, antennarum articulo 1°, dimidio apicali femorum anteriorum intermediarumque, tibiis omnibus ad basin, et interdum elytris et lateribus abdominis supra subiusque, sat conferte rufo-sparsis.*

♂ ♀. Long. 6, lat. 2 m. m.

*Hab.* in intermediis insulæ—"Plantation."

Sometimes the apical half of the antennæ is vinous-red in colour and the fuscous markings generally more suffused with red.

### 11. ORTHOTYLUS MUTABILIS, sp. n.

*O. pallide fusco-brunneus, capillis pallidis vestitus; pronoti margine postico elytrorumque margine exteriori anguste fusco-nigris; elytris lutescenti-vel viridescenti-fuscis; antennis pedibusque rufo-fuscis, illarum articulis 1° ad basin, 2° ad apicem, 3° 4°que, necnon tarsorum articulo ultimo et interdum tibiis ad basin, obscurioribus; rostro ochraceo, apice fusco-nigro; membrana pallide fusca venis dilutioribus. Sat angustus, elongatus; antennis  $\frac{4}{5}$  corporis æquilongis, articulo 3° plus dimidio 2<sup>a</sup> longiore, 4°  $\frac{1}{2}$  3<sup>a</sup> subæquilongo; rostro coxas posticas haud superante; pronoti lateribus vix sinuatis, callis parvis; scutello convexo, ante medium transverse depresso.*

♂ ♀. Long. 4 m. m.

*Hab.* editoribus insulæ—"West Lodge" et "Diana's Peak."

Very variable in the intensity of the coloration. It is allied, but not very closely, to *O. nassatus*, and belongs to the same group of the genus.

### 12. LYGUS APICALIS, Mey., Fieb.

*Hab.* in intermediis insulæ—"Plantation."

A South-European species, probably introduced into St. Helena.

### AGRAMETRA, gen. nov.

*Corpus oblongo-ovatum, sat rude punctatum, nudum. Caput nutans, latum, convexum; clypeo modice producto, compresso, a fronte parum discreto; vertice immarginato; gula brevi. Oculi oblongi, leviter granulati, pronoto contigui. Antennæ sat crassæ, ad oculorum medium internum insertæ, corporis dimidio subæquilongæ, articulo 1° crasso apicem clypei longe superante. Rostrum coxas posticas vix attingens, articulo 1° capitis basin vix superante. Pronotum trapeziforme, convexum, latitudine apicali vix longius, basi quam apice  $\frac{1}{3}$  latius, apice, lateribus et basi ante scutellum leviter sinuatis. Scutellum ad basin detectum. Hemelytra completa, corii margine exteriori ad basin subito dilatato-explanato; clavo, corio cuneoque coriaceis; membrana biareolata. Alæ hamo instructæ. Pedes sat breves; femoribus sat incrassatis; tibiis*