

modice fusco-spinulosis sed haud punctatis; tarsis posticis longioribus, articulo ultimo duobus primis simul sumptis paullo brevioribus.

Generibus *Plagiognatho* et *Sthenaro* subaffinis.

13. *AGRAMETRA ÆTHIOPS*, sp. n. (Plate XXXI. fig. 2.)

A. *piceo-nigra nitida; rostro (apice excepto), coxis, femoribus, tarsorumque articulo ultimo piceo-brunneis; antennis, tibiis, tarsorumque articulis duobus primis sordide ochraceis; antennarum articulo 1° ima basi, articulo 2° ad apicem, 3° 4°que piceo-nigris, imis apicibus 2ⁱ 4ⁱque dilutioribus; membrana fusca, venis parva cellulae exterioris rufis; antennis, pedibus abdomineque capillis tenuibus pallide fuscis vestitis; antennarum articulo 1° paullo supra basin subito incrassato, valido, cylindrico; 2° sursum sensim incrassato, quam pronoti basis brevioribus, 3° 4°que fusiformibus, 3° $\frac{1}{2}$ 2° paullo longiore, 4° $\frac{2}{3}$ 3ⁱ subæquilongis.*

♂ ♀. Long. $3\frac{1}{2}$ m. m.

Hab. in regione *Commidendri robusti* DC. (anglice "Gumwood")
— "Luffkins" et "Thompson's Wood."

14. *PSALLUS FLAVOSPARSUS*, sp. n.

P. *testaceus, capillis pallidissime aureis vestitus, capite thoraceque præterea pilis nigris validioribus instructis; capite, pronoto scutelloque ad basin fusco-atris indistincte nigro-guttulosis et maculis flavidis (una ad marginem anteriorem oculi, una utrinque pone marginem anticam et altera in disco pronoti, necnon una distinctiore in angulis anticis scutelli) ornatis; angulis imis posticis pronoti testaceis; scutello ad apicem clavoque flavo-guttulosis, corio cuneoque flavo- et fusco-sparsis, macula orbiculari prope apicem clavi et macula irregulari oblonga ante mediam basin cunei fusco-nigris; membrana dilute fusca, iridescente, basi et fascia angusta transversa pone albidas venas dilutioribus; antennis testaceis, annulo prope basin et macula ad anteriorem articuli 1ⁱ, annulis basali apicali 2ⁱ, 3° 4°que fusco-nigris; femoribus anticis et intermediis ad apicem, margine apicali antico femorum posteriorum, necnon tibiis omnibus e punctis nigris nigro-spinulosis; articulo ultimo tarsorum fusco; antennis mutilatis, sed, ut videtur, articulis 3° 4°que simul sumptis saltem 2° æquilongis.*

♀. Long. 3 m. m.

Hab. in regione *Commidendri robusti* DC. (anglice "Gumwood")
— "Thompson's Wood."

15. *PSALLUS LUTOSUS*, sp. n.

P. *Sat robustus, testaceus, opacus, aureo-pubescentis, rufescenti-brunneo dense irroratus; signaturis obscuris plus minus confluentibus, præsertim in parte antica pronoti, medio apicæque scutelli, apicibus clavi corique necnon femoribus; antennis rufo-brunneis, articulo 1° ad apicem testaceo, articulo 2° ad basin apicemque et articulis duobus ultimis fusco-brunneis; tibiis testaceis, annulis*