

- Corpo com um só tipo de pêlos . . . . . 45
45. Pubescência longa, lanosa, prateada; cúneo tão longo quanto largo na base; segmento I da antena mais curto do que a metade da largura do vértice . . . . . *TIGREMIRIS* n. gen.
- Pubescência normal; cúneo mais longo que largo na base; segmento I da antena mais longo que metade da largura do vértice . . . 46
46. Rostro curto, atingindo o meio do mesoesterno; segmento II antena muito curta, de comprimento aproximadamente igual a metade da largura do vértice; corpo largo, compacto . . . . . *TAMOIOCORIS* Carvalho, 1984
- Rostro mais longo, alcançando as coxas medianas ou além; segmento I da antena de comprimento aproximadamente igual a largura do vértice; corpo alongado, lados semiparalelos . . . . . *ORTHOTYLUS* Fieber, 1858

#### *Biobiocoris* n. gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado-oval, liso, levemente rugoso no pronoto e escutelo, revestido de dois tipos de pubescência: pêlos escamosos prateados sob luz incidente e pêlos negros semi-erectos mesclados com cerdas erectas na cabeça, pronoto e lados do embólio.

Cabeça muito mais larga que longa, olhos salientes, comprimidos, contíguos ao pronoto, vértice marginado, carenado com fileira de cerdas erectas (Fig. 2), cabeça vista de lado com a margem inferior dos olhos não ultrapassando o nível dos pedúnculos antenais inferiormente, jugo e loro grandes, subiguais, clipeo curvo, saliente, búcula pequena, gena bem desenvolvida, gula reduzida, rostro alcançando as coxas medianas, segmento I alcançando a base das coxas anteriores; antena cilíndrica, segmento I mais grosso que os demais, com três cerdas erectas na face interna, segmento II seis vezes mais longo que o I, coberto por pêlos de comprimento menor que sua grossura.

Pronoto com calos pouco salientes, colar estreito e deprimido, margens laterais e posterior retas, ângulos umerais arredondados, mesoescuto descoberto, escutelo plano, levemente rugoso.

Hemiélitro com embólio levemente engrossado, cúneo duas vezes mais longo que largo na base, membrana biareolada.

Pernas de comprimento médio, fêmures e tíbias com pêlos e espinhos negros, nestas últimas de comprimento menor que sua grossura. Pigóforo com parâmetro esquerdo largo e triangular quando visto de lado.

Espécie tipo do gênero: *Biobiocoris setosus* n. sp.

Difere de *Melanothricus* Reuter, 1875 pelo

comprimento do segmento I da antena, pela carena do vértice provida de uma fileira de cerdas erectas; de *Incacoris* Carvalho, 1961 difere pela ausência de escamas negras, pela fronte lisa, pelo vértice muito mais largo e carena muito mais alta e cerdas erectas muito mais robustas.

#### *Biobiocoris setosus* n.sp.

(Figs. 1-5)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

*Macho*: comprimento 4,6 mm, largura 1,6 mm. *Cabeça*: comprimento 0,2 mm, largura 1,2 mm, vértice 0,60 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,8 mm; III, 0,8 mm; IV, 0,4 mm. *Pronoto*: comprimento 0,5 mm, largura na base 1,5 mm. *Cúneo*: comprimento 0,80 mm, largura na base 0,40 mm.

Coloração geral castanho-escura; pronoto e escutelo mais escuros, olhos castanhos, pequena mancha mediana posterior no vértice ou toda a margem posterior do vértice, face posterior dos olhos pálida, membrana fusca.

Lado inferior castanho-escuro, jugo, loro, xifo do prosterno, fenda coxal anterior, placa basilar, peritrema ostiolar, parte apical das coxas, porção inferior-mediana do abdome pálidos, faixa longitudinal superior lateralmente fusca, pigóforo, coxas e pernas castanhos, tíbias com espinhos negros de comprimento menor que a grossura da mesma, sem manchas negras na base.

Características morfológicas como enunciadas para o gênero.

*Genitália*: pênis (Fig. 3) com vésica apresentando várias ramificações, sendo quatro delas serradas, como mostra a ilustração. Parâmetro esquerdo (Fig. 4) com extremidade apical bipartida. Parâmetro direito (Fig. 5) simples, falciforme na extremidade apical.

*Fêmea*: coloração e aspecto geral semelhantes ao macho, área dos calos, meio da fronte e manchas no vértice pretas, olhos castanhos, mancha mediana posterior no vértice e mancha do lado do olho atrás do pedúnculo antenal pálidas, membrana fusca.

Lado inferior pálido-enufescado a castanho-claro, cabeça lateralmente pálida, clipeo e mancha característica na parte anterior do loro, pretos, abdome claro com faixa longitudinal superior fusca.

*Holótipo*: macho, El Abanico, Bio Bio, CHILE, XII.30.50, Ross & Michelbacher col., na coleção da Academia de Ciências da Califórnia. *Parátipos*: 9 machos e 18 fêmeas, mesmas indicações que o tipo; 2 machos, Chile, Vegas Flaco,