

gênero pela coloração pálida, praticamente unicolor.




Fig. 3 – *Falconiodes concolor* Reuter, 1905, fêmea, holótipo.

Monalocorisca conspurcata Reuter, 1913

Monalocorisca conspurcata Reuter, 1913:63; id. Carvalho, 1975:454; figs. 7-11.

Esta espécie foi descrita por Reuter de 1 exemplar fêmea proveniente do Brasil, coligido por J. F. Sahlberg e depositado no Museu de Helsinki. O exemplar com o rótulo manuscrito de Reuter não possui todavia indicação de localidade e traz apenas um pequeno retângulo verde (indicação de material coligido por Sahlberg). Junto a ele acham-se três

outros exemplares: um com o rótulo de *Monalocorisca conspurcata* (manuscrito de Reuter), outro sem rótulo e um terceiro com apenas o rótulo *Monalocorisca*. Esses três exemplares pertencem ao gênero *Tropidosteptes* Uhler, 1878.

A espécie ocorre nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais.

Neostenotus Reuter, 1905

Neostenotus Reuter, 1905:21, Fig. 10; id. Carvalho & Gomes, 1972:85.

Alda Reuter, 1909:4 (nov. *sinonímia*); id. Carvalho & Gomes, 1972:85.

Por um lapso, desses que não podem ter explicação fácil, o gênero de Reuter descrito em 1905 foi colocado na *sinonímia* do outro descrito em 1909. A lei da prioridade é regra comesinha entre os sistematistas. Portanto, só nos cabe retificá-lo aqui, lembrando que *Neostenotus* Reuter, 1905 tem prioridade sobre *Alda* Reuter, 1909 e portanto deverá ser mantido como válido e com precedência sobre o segundo. A *sinonímia* entre ambos é correta.

As espécies incluídas em *Alda* Reuter até o presente, deverão ter a seguinte designação:

✓ *Neostenotus bahianus* (Carvalho, 1976)

✓ *Neostenotus bifasciatus* (Carvalho & Fontes, 1972)

✓ *Neostenotus bipunctatus* (Reuter, 1905)

✓ *Neostenotus bocainus* (Carvalho & Fontes, 1972) *bocaina*

✓ *Neostenotus ecuatorianus* (Carvalho & Gomes, 1969) *ecu.*

✓ *Neostenotus fuscipennis* (Reuter, 1909)

✓ *Neostenotus juruenus* (Carvalho & Fontes, 1972)

Neostenotus paulistanus (Carvalho & Fontes, 1972)

Neostenotus pechinchanus (Carvalho & Gomes, 1969)

Neostenotus planaltinus (Carvalho & Fontes, 1972)

Neostenotus rufinervis (Reuter, 1908)

Neostenotus bipunctatus Reuter, 1905

Neostenotus bipunctatus Reuter, 1905:22 (Fig. 4)

Caracterizada pela coloração da área anterior do pronoto e pelas suas dimensões.