

- nal na região anterior da propleura ou ângulo lateral anterior 12
12. Jugo e clipeo (às vezes o loro) pretos; hemiélitros com manchas esverdeadas ou verdes *mexicana* n. sp.
– Jugo e clipeo pálidos 13
13. Antena (exceto segmento I) preta; ápice do embólio pálido; mancha escura da propleura não se estendendo sobre o colar *ecuatoriana* n. sp.
– Antena pálida; ápice do embólio esverdeado; mancha escura da propleura estendendo-se sobre o colar lateralmente *costaricana* n. sp.
14. Clavo negro em sua maior extensão, com mancha ou faixa pálida bem definida ao nível do ápice do escutelo 15
– Clavo pálido em sua maior extensão ou negro na base, internamente ou na comissura, sem a mancha clara acima 17
15. Pronoto (exceto margem posterior) todo negro; mancha negra transversal do cório larga e alcançando o embólio *clavonotata* n. sp.
– Pronoto pálido pelo menos na área dos calos ou com duas manchas negras laterais 16
16. Cabeça preta; mancha transversal da comissura corial larga, não alcançando o embólio *jamaicana* n. sp.
– Cabeça parcialmente pálida; mancha transversal da comissura alcançando o embólio *venezuelana* n. sp.
17. Cabeça totalmente preta até a margem posterior do vértice 18
– Cabeça pálida ou com faixa transversal pálida no vértice ou ao lado dos olhos 19
18. Embólio e cúneo com tonalidade esverdeada; clavo na área sub-basal, região comissural e ápice negros *brasíliana* Carvalho & Ferreira
– Embólio e cúneo de coloração pálida; clavo negro apenas na região basal *veracruzana* n. sp.
19. Cório com duas manchas arredondadas (irregulares) no meio, ao nível do ápice do clavo; pronoto pálido com ângulos umerais escuros *crotonica* n. sp.
– Hemiélitros sem manchas arredondadas no meio do cório 20
20. Hemiélitros sem mancha ou faixa negra transversal ao nível da comissura corial; jugo e clipeo pretos 21
– Hemiélitros com mancha ou faixa negra transversal ao nível da comissura corial bem marcada; jugo e clipeo geralmente pálidos 22
21. Escutelo totalmente preto; antena com segmento II pálido no meio (exemplares pronoto colorido) *mexicana* n. sp.
– Escutelo preto apenas na região mediana ou na extremidade apical; segmento II da antena preto *schaffneri* n. sp.
22. Disco do pronoto pálido em sua maior extensão central, negro apenas nas margens laterais ou posterior 23
– Disco do pronoto preto em sua maior extensão ou com manchas pretas bem definidas em sua superfície 24
23. Escutelo pálido (escuro apenas no meio da base); clavo negro na área comissural; disco do pronoto com faixa transversal na margem posterior e ângulos umerais *fasciata* Distant
– Escutelo preto ou com pelo menos área apical preta; disco do pronoto negro apenas dos lados *nigroscutellata* n. sp.
24. Pronoto preto com área pálida em forma de T cobrindo a superfície dos calos e faixa longitudinal posterior no meio do disco *burkei* n. sp.
– Pronoto de outra cor ou com área dos calos negra 25
25. Hemiélitro com mancha negra na região comissural do cório não alcançando o embólio; escutelo negro na região mediana *pendula* Van Duzee
– Hemiélitro com faixa longitudinal na região comissural do cório alcançando (na maioria dos exemplares) o embólio; escutelo pálido na região mediana *fasciolata* Reuter

Paraproba amazonica* Carvalho, 1983Paraproba amazonica* Carvalho, 1983:180, figs. 7-10.

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 4,2 mm, largura 1,2 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,5 mm, vértice 0,20 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,1 mm; III, 0,9 mm; IV, 0,2 mm. **Pronoto:** comprimento 0,6 mm, largura na base 1,1 mm. **Cúneo:** comprimento 0,68 mm, largura na base 0,28 mm (holótipo).

Coloração geral pardo-amarelada a cinamômea com áreas castanhas e negras; cabeça negra, olhos castanhos, segmento I da antena pardo-amarelado, demais segmentos negros.