



Paraproba cincta Van Duzee; Fig. 12 – macho, lectótipo; Fig. 13 – vésica; Fig. 14 – parâmero esquerdo; Fig. 15 – parâmero direito.

***Paraproba clavonotata* n. sp.**

(Figs. 16-19)

Caracterizada pela coloração do clavo.

Fêmea: comprimento 3,8 mm, largura 1,0 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,28 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,2 mm; III, 0,5 mm; IV, 0,6 mm. **Pronoto:** comprimento 0,4 mm, largura na base 0,8 mm. **Cúneo:** comprimento

0,60 mm, largura na base 0,22 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelada com áreas negras; cabeça, olhos, antena (exceto segmento I que é castanho-claro) pretos, rostró pálido, margem posterior do vértice pálida.

Pronoto preto, colar e margem posterior (inclusive os ângulos umerais) pálidos; mesoes-cuto e escutelo (exceto ápice) negros.

Hemiélitros pálidos (exceto na extrema base e na faixa transversal do cório, ao nível da comissura corial, que atinge o embólio), clavo