

Olhos situados no meio da cabeça (distantes do pronoto), cúneo menos alongado (5:2).

Genitália: penis (Fig. 46) com placa basal bem desenvolvida, teca larga, em forma de calha, com três espículos: dois deles alongados, o mais longo serreado no terço apical, o terceiro curto e curvo. Parâmero esquerdo (Fig. 47) com um lobo dorsal rombudo. Parâmero direito (Figs. 48-49) característico, com dois prolongamentos dentiformes

Fêmea: semelhante ao macho em aspecto geral e coloração, vértice 0,30 mm.

Holótipo: macho, Socorro Id., 2.000 ft, May 8, 1925, H. H. Keifer, na coleção da Academia de Ciências da Califórnia. **Parátipos:** 1 macho e 1 fêmea, na coleção acima e do autor.

Difere das demais espécies do gênero pela faixa pálida em toda a extensão mediana (transversal) do pronoto.

O nome específico é alusivo a sua posição insular.

***Paraproba jamaicana* n. sp.**

(Figs. 50-53)

Caracterizada pela comprimento do rostro, pela cor do clavo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 3,6 mm, largura 0,9 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,24 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,5 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,7 mm. **Pronoto:** comprimento 0,4 mm, largura na base 0,8 mm. **Cúneo:** comprimento 0,84 mm, largura na base 0,26 mm (holótipo).

Coloração geral pálida a pálido-esverdeada com áreas pretas; cabeça (exceto vértice posteriormente e região lateral anterior aos olhos), segmentos II e III da antena, pequena mancha entre os calos, duas manchas laterais no pronoto sem alcançar a margem posterior e ângulos umerais (continuada com a mancha da propleura), mesoescuto, escutelo, clavo (exceto mancha mediana e margens laterais externas), mancha

na comissura corial do cório, afilada para fora de ambos os lados, extrema margem externa do embólio, margem interna do cúneo (às vezes também a extrema margem externa) e nervuras da membrana, pretos a fuscos.

Lado inferior com a parte anterior do xifo, mesoescuto, propleura (exceto margens anterior e inferior), meso e metapleuras, abdome dos lados e ápice do rostro negros, coxas e pernas pálido-esverdeadas, tíbias castanhas.

Corpo coberto com pêlos curtos e algumas cerdas erectas, rostro alcançando os segmentos III ou IV do abdome.

Genitália: vesícula do edeago pequena, tendo além do gonóporo secundário um espículo alongado com farpas apicais e outro maior com denticulos na extremidade apical (Fig. 51). Parâmero esquerdo (Fig. 52) alongado, com uma projeção mediana fina e outra menor anterior a ela, porção apical rombuda, recoberto por cerdas longas. Parâmero direito (Fig. 53) com uma dilatação dorsal e um dente subapical, porção terminal com cerdas.

Fêmea: idêntica ao macho em aspecto geral e coloração, vértice 0,28 mm.

Holótipo: macho, Jamaica, St. Andrew Parish, Content Gap, Pine Grove Hotel, 3.600 ft. 8-10.VIII.85, J. E. Eger, na coleção do Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos da América, Washington, D.C. **Parátipos:** macho e 2 fêmeas, nas coleções do Professor J. C. Schaffner, Departamento de Entomologia, Universidade de Texas A & M., e do autor.

Diferencia das demais espécies do gênero pela morfologia da genitália do macho e pela coloração do clavo.

O nome específico é alusivo a Jamaica, onde os exemplares foram colecionados.

***Paraproba mexicana* n. sp.**

(Figs. 54-61)

Caracterizada pela coloração do loro e do clipeo e pela morfologia da genitália do macho.