

cório fuscas e negras, margem externa do embólio e do cúneo finamente negras em alguns exemplares.

Lado inferior pálido, propleura, mesoes-terno, meso e metapleura, lados do abdome (em alguns exemplares e ápice do abdome) negros, coxas e pernas pálidas.

Características morfológicas como indica-das para o gênero.

Macho: aspecto geral e coloração seme-lhante à fêmea, vértice 0.34 mm.

Genitália: vésica do edeago (Fig. 71) com espículo alongado, porção apical característica e um outro menor, recortado no ápice. Parâ-mero esquerdo (Fig. 72) curvo, com giba dorsal, cerdas erectas e um dente subapical. Parâmero direito (Fig. 73) com três cerdas dorsais e um dente grande e curvo para trás em seu meio.

Exemplares estudados: 2 fêmeas, Leona Heights, Alameda Co., Cal., Aug., J. C. Bradley col., cotypes; 2 machos, Berkeley, 6.23.15, Cal., E. O. Essig col., H. G. Barber collection 1950, USNM; 2 fêmeas, paratypes, Leona Heights, Alameda Co., Cal., Aug. J. C. Bradley col., E. P. Van Duzee col.; fêmea, paraty-pe, San Diego Co., 6.4.6, Cal., E. P. Van Du-ze; fêmea, Leona Heights, Oakland, Cal., 7.31.27, E. P. Van Duzee; male, Victoria, B. C., 14.VII.18, W. Downes, Parshley collection; male, Dyerville, Cal., VIII.16.64, B. P. Bliven col.; male, Califórnia, San Francisco, Golden Gate Park near Cal. Acad. Sci. (S lawn), Aug. 11, 1982, T. C. Tyler col. Cas; fêmeas, Berke-ley, Cal., 7.9.1937, K. D. Snyder; Land and S. J. Cal., F. Muir, VII.1917; Palo Alto, Cal., 5 July, 1895, in the author's collection.

Diferencia-se das outras espécies do gênero pela coloração do segmento I da antena, pela mancha difusa do hemiélitro e pela morfologia da genitália do macho.

Segundo Van Duzee a espécie foi descrita baseando-se em numerosos exemplares de Palo Alto, Califórnia.

***Paraproba schaffneri* n. sp.**

(Figs. 74-77)

Caracterizada pela coloração do escutelo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 4,4 mm, largura 1,3 mm. *Cabeça*: comprimento 0,3 mm, largura 0,7 mm, vértice 0,28 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,7 mm; III, 0,8 mm; IV, 0,5 mm. *Pronoto*: comprimento 0,4 mm, largura na base 1,0 mm. *Cúneo*: comprimento 0,74 mm, largura na base 0,30 mm (holótipo).

Coloração geral pálida a pálido-esverdeada, translúcida com áreas negras; cabe-ça (exceto vértice), antena (exceto segmento I que é enfuscado e pálido para a base), pronoto (exceto mancha anterior entre os calos e porção central do disco atingindo a margem posterior dentro do limite do mesoescuto), mancha me-diana do mesoescuto e do escutelo, extrema margem escutelar interna do clavo, extrema margem externa do embólio, comissura corial, nervuras da membrana e ápice do cúneo pretos a fuscos, membrana enfuscada, margem interna apical do embólio e margem externa do cúneo esverdeadas.

Lado inferior preto, coxas, pernas e porção central inferior do abdome pálidas (este último negro dos lados nos segmentos e no ápice), tí-bias e tarsos III castanhos, rostro pálido, ápice fusco.

A coloração mostra-se variável na espécie, tendo alguns exemplares a cabeça pálida em to-da extensão do vértice, menor mancha preta la-teral no pronoto, segmento I da antena pálido e lados da cabeça da mesma cor.

O rostro alcança o ápice das coxas poste-riores.

Genitália: vésica do edeago (Fig. 75) com um espículo alongado bem definido, revestido de pequenas farpas na porção apical e outro maior com duas pontas falciformes. Parâmero esquerdo (Fig. 76) alongado, com uma projeção dorsal característica, extremidade apical rom-buda e numerosas cerdas dorsais. Parâmero di-reito (Fig. 77) menor, com uma ponta subapical em forma de espinho e voltada para a base.