



Eustictus incaicus n. sp.: Fig. 1 - macho, holótipo; Fig. 2 - vésica; Fig. 3 - parâmetro esquerdo; Fig. 4 - parâmetro direito.

Macho: comprimento 5,0 mm, largura 1,6 mm. **Cabeça:** comprimento 0,4 mm, largura 1,0 mm, vértice 0,10 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,6 mm; III e IV mutilados. **Pronoto:** comprimento 0,9 mm, largura na base 1,4 mm. **Cúneo:** comprimento 0,64 mm, largura na base 0,40 mm (holótipo).

Coloração geral castanho-clara com áreas castanho-escuras; cabeça (exceto clipeo, região anterior aos olhos e rostro pálido-amarelados, antena castanho-clara, pronoto com área dos calos e escutelo castanho-escuros, superfície do disco castanho-clara, ângulos umerais e extrema margem posterior do disco mais claros; hemiélitro castanho-claro, extrema base e região apical do clavo, extremo ápice externo do cório, ápice do embólido, comissura corial e margem apical do cúneo castanhos a fuscus, membrana translúcida.

Lado inferior com propleura (exceto margem inferior), mesoescuto lateralmente, meso e meta-pleura castanhos, abdome com margem superior castanha lateralmente, pigóforo mais escuro, coxas e orifício ostiolar pálidos, fêmur III com mancha subapical negra, tibiass castanho-claras.

Corpo pontuado, recoberto por pubescência longa e erecta, olhos muito grandes, comprimidos, alcançando a gula inferiormente, segmento I da an-

tena mais curto que a altura do olho, vértice muito estreito, rostro alcançando as coxas medianas.

Genitália: pênis do tipo Surinamellini Carvalho e Rosas (Fig. 2) com dois lobos membranosos tendo espinhos esclerosados em sua superfície apical. Parâmetro esquerdo (Fig. 3) com lobo basal grande, pontudo no ápice e piloso na superfície dorsal, extremidade apical afilada e curva. Parâmetro direito (Fig. 4) muito pequeno, alargado no meio e afilado na extremidade apical.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, PERU, 40 km N Chiclayo, Lambaieque, I.17.1955, E.I., Schilinger e E.R. Ross col., na coleção da Academia de Ciências da Califórnia, San Francisco. **Parátipo:** macho, mesmas indicações que o tipo.

Aproxima-se bastante de *Eustictus guaraniensis* Carvalho e Carpintero (na imprensa) pela coloração do corpo, diferindo no entanto pelo maior comprimento do corpo, segmento I da antena mais longo e pela morfologia da genitália do macho.

O nome específico é alusivo ao povo inca que habitou a região no passado.

O gênero *Eustictus* Reuter, 1909 deverá ser incluído na tribo Surinamellini Carvalho e Rosas, 1962 por possuir o corpo brilhante, antena com segmentos de grossura igual, tendo o último deles a forma fusiforme, aspecto geral mirmecófilo (muitas espécies possuem a base do cúneo mais clara), vésica do macho dividida em dois lobos membranosos. Essa tribo reúne as espécies mirmecomorfas ou mirmecóides da subfamília Deraeocorinae Douglas e Scott, 1865.

Perumiris n. gen.

Mirinae, Mirini. Corpo alongado, recoberto por pubescência semi-erecta e pêlos lanosos, prateados (hemiélitros).

Cabeça alongada, semi-horizantal, pouco mais larga que longa quando vista de lado (comprimento anterior aos olhos 0,3 mm, da margem anterior do olho ao vértice 0,4 mm) com loro proeminente e largo, rostro alcançando pouco além do meio do mesoesterno, fronte lisa, vértice levemente marginado, olhos removidos do pronoto por um espaço igual à grossura do segmento I da antena, comprimidos, antena com pêlos de comprimento igual ou menor que a grossura dos segmentos, segmento II engrossado para a extremidade apical, clipeo visivelmente arqueado, pescoço curto porém visível (Figs. 5-7).

Pronoto e escutelo fortemente pontuados, o primeiro estreitado para a cabeça, calos planos, pontuados entre si e na área logo após o collar, mesoescuto exposto.

Hemiélitros lisos, com dois tipos de pêlos: lanosos e prateados, dispostos em pequenos tufo