

pêlos normais, semi-adpressos, cuneo ligeiramente mais longo que largo na base, levemente arredondado externamente.

Pernas de comprimento médio, fêmures com cerdas longas inferiormente e uma fileira de denticulos esclerosados superiormente, tíbias com pêlos espiniformes e fileiras de denticulos esclerosados.

Espécie tipo do gênero: *Perumiris machupichanus* n. sp.

Gênero que pelo aspecto geral lembra *Tropidosteptes* Uhler, 1878 diferenciando-se por ter o hemiélitro liso e com dois tipos de pubescência; de *Chrysodasia* Reuter, 1892 do qual muito se aproxima difere por ter os olhos distantes da margem anterior do pronoto por espaço igual à grossura do segmento I da antena e pelo vértice liso.

O nome genérico é alusivo ao país de origem do tipo da espécie.

Perumiris machupichanus n. sp.
(Figs. 5-10)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 4,2 mm, largura 1,8 mm. *Cabeça*: comprimento 0,3 mm, largura 0,8 mm, vértice 0,40 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,2 mm; III e IV mutilados. *Pronoto*: comprimento 0,7 mm, largura na base 1,6 mm. *Cúneo*: comprimento 0,60 mm, largura na base 0,50 mm (holótipo).

Coloração geral castanha com áreas pálido-amareladas; cabeça negra com duas manchas pálidas no vértice ao longo da margem interna dos olhos, segmento I da antena e segmento II na porção basal pálidos (este último preto na metade apical), cabeça vista de lado com loro negro (em alguns exemplares com faixa longitudinal mediana pálida), gula pálida com mancha posterior negra, pescoço negro, rostro pálido.

Pronoto castanho-claro com área dos calos e escutelo negros (em alguns exemplares apenas a parte externa na área dos calos é negra e o escutelo é castanho-claro).

Hemiélitros castanho-escuros, porção apical do clavo e ápice do cuneo mais claros a pálidos (em alguns exemplares também a base do endocório e a porção extrareolar da membrana são mais claros, nervuras pálidas).

Lado inferior castanho, mesoescurto, metapleura e abdome mais escuros, pernas pálido-amareladas, fêmures III com dois anéis subapicais negros.

Características morfológicas como descritas para o gênero.

Genitália: véscica do edeago (Fig. 8) com um espículo mediano esclerosado bem nítido. Parâmetro esquerdo (Fig. 9) com lobo basal grande e recoberto

de cerdas, extremidade apical afilada e recurva. Parâmetro direito (Fig. 10) menor, dilatado na porção apical, terminado em ponta levemente curva.

Fêmea: com aspecto geral e coloração semelhantes ao macho.

Holótipo: macho, PERU, Machupichu, VII. 64, Borys Malkin col., na coleção do Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos da América, Washington, D.C. *Parátipos*: 4 machos e 3 fêmeas, mesmas indicações que o tipo, na coleção do autor.

O nome específico é alusivo à cidade de Machupichu famosa pelas construções da civilização Inca.

Neocapsus zopilotes n. sp.
Poecilocapsus agrarius Distant, part. 1884:275
(Figs. 11-14)

Caracterizada pela coloração do pronoto e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 6,2 mm, largura 2,8 mm. *Cabeça*: comprimento 0,4 mm, largura 1,2 mm, vértice 0,54 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,8 mm; II, 2,0 mm; III, 1,1 mm; IV, 1,1 mm. *Pronoto*: comprimento 1,2 mm, largura na base 2,4 mm. *Cúneo*: comprimento 0,90 mm, largura na base 0,60 mm (holótipo).

Coloração geral preta brilhante com áreas lutescentes; região central da fronte, meio do disco longitudinalmente, alcançando ou não a margem posterior do pronoto (com acentuada variação nos diversos exemplares), margens laterais e margem posterior do disco lutescentes, a margem externa extrema do embólio e do cuneo também finamente lutescentes; membrana fusca, nervuras pálidas.

Lado inferior castanho a castanho-escuro, margem superior da propleura e faixa longitudinal no mesoesterno lutescentes, lados da propleura castanho-escuros a avermelhados, meio do mesoesterno mais escuro, pernas castanhas.

Características morfológicas como indicadas para o gênero, rostro alcançando as coxas medianas ou posteriores.

Genitália: véscica do edeago (Fig. 12) com seis lobos espiculares, conforme mostra a ilustração, gonoporo secundário pequeno. Parâmetro esquerdo (Fig. 13) com lobo basal desenvolvido, curvo, extremidade apical globosa (com uma pequena ponta). Parâmetro direito (Fig. 14) alongado, agudo na extremidade apical.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, Venta de Zopilote, Guerrero, 2800 ft. Oct., H.H. Smith, Distant col., 1811, 383, na coleção do Museu Britânico de História Natural. *Parátipos*: 5 machos, mesmas indicações que o tipo, com o rótulo de *Poecilocapsus agrarius*, B.C. Amer., Hem.; macho, 49 mi South Iguala,