

vértice (exceto margem posterior) negras, segmentos I e III da antena, rostró pálidos.

Pronoto preto, colar e margem posterior do disco, inclusive os ângulos umerais pálidos (em alguns exemplares também a área anterior aos calos); escutelo negro com mancha apical pálida.

Hemiélitro pálido, clavo e mancha transversal subapical no cório, bifurcada ou dividida externamente ao nível do ápice do clavo pretos; membrana fusca.

Lado inferior castanho, propleura, mesoesterno, pleuras e ápice do abdome pretos, coxas e pernas pálidas, fêmur III com mancha mediana e subapical negras.

Rostro com pêlos semierectos, rostró longo, alcançando o IV ou V segmento do abdome, cabeça arredondada, olhos pouco distantes do pronoto, disco levemente rugoso, segmento II da antena levemente engrossado para a extremidade nos machos.

**Genitália:** pênis (Fig. 5) com três espículos esclerosados: dois bifurcados e com serreações apicais e um terceiro mais largo na extremidade. Parâmero esquerdo (Fig. 6) bifurcado, ramo maior com uma excrescência subapical. Parâmero direito (Fig. 7) alongado, afilado na extremidade, com excrescência subapical.

**Fêmea:** semelhante ao macho em coloração e aspecto geral, vértice 0,32 mm.

**Holótipo:** macho, Represa Rio Grande, Rio de Janeiro, BRASIL, F. M. Oliveira, na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro. **Parátipos:** 22 machos e 9 fêmeas, mesmas indicações que o tipo; nas coleções do Museu Nacional e do autor.

Difere das espécies próximas pela morfologia da genitália do macho e pela maior extensão da coloração pálida no pronoto.

O nome específico é alusivo à cidade do Rio de Janeiro onde o material foi colecionado.

*Adparapropa dispersa* n.sp.  
(Figs 8-10)

Caracterizada pela mancha pálida em forma de T no pronoto e pela morfologia da genitália do macho.

**Fêmea:** comprimento 3,8 mm, largura 1,0 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm, vértice 0,34 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,2 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,7 mm. **Pronoto:** comprimento 0,5 mm, largura na base 0,9 mm. **Cúneo:** comprimento 0,60 mm, largura na base 0,30 mm (holótipo).

Coloração geral pálida com áreas pretas; cabeça preta, região lateral e margem posterior do vértice pálidos, segmentos I e III da antena pálidos; pronoto preto com mancha característica em forma de T na região dos calos, ângulos umerais e margem posterior largamente pálidos; mesoesterno e escutelo

pretos, mancha apical neste último pálida; hemiélitros pálidos, clavo e mancha subapical no cório (ao nível do ápice do clavo pretos) praticamente bifurcada pretos; membrana fusca.

Corpo revestido de pêlos semiadpressos, erectos na cabeça e margem anterior do pronoto, rostró alcançando as coxas III, segmento II da antena engrossado para o ápice.

**Macho:** semelhante a fêmea em coloração e aspecto geral.

**Genitália:** vésica do edeago (Fig. 9) com três espículos característicos, com serreações em suas margens. Parâmero direito (Fig. 10) alongado, afilado na extremidade apical, com um lobo ou excrescência subapical. Parâmero esquerdo perdido durante a dissecação do único exemplar macho em mãos.

**Holótipo:** fêmea, Casa Nova, Pernambuco, Brasil, V. 74, J.C M. Carvalho col., na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro. **Parátipos:** 2 fêmeas e 1 macho, Águas Vermelhas, Minas Gerais, XXII.83, M. Alvarenga; Brasilien, Nova Teutonia, 27°11'S 52°23'L, Fritz Plaumann, V.945; Chapada, Mato Grosso, Brasil, março, na coleção do autor.

Difere das outras espécies do gênero pela mancha pálida em forma de T no pronoto e pela morfologia da vésica do edeago.

O nome específico é alusivo a sua ampla distribuição geográfica.

*Adparapropa gabrieli* n.sp.  
(Figs 11-14)

Caracterizada pela coloração preta do abdome e pela morfologia da genitália do macho.

**Macho:** comprimento 3,6 mm, largura 1,0 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm, vértice 0,30 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,4 mm; III, 0,5 mm; IV, 0,6 mm. **Pronoto:** comprimento 0,5 mm, largura na base 0,8 mm. **Cúneo:** comprimento 0,50 mm, largura na base 0,30 mm (holótipo).

Coloração geral pálida com áreas pretas a castanho-escuras; segmentos I e III da antena, extrema margem posterior do vértice, face posterior dos olhos, colar, extrema margem anterior do pronoto, ângulos umerais e extrema margem posterior do disco, mancha apical do escutelo pálidos; hemiélitro com clavo, metade apical do cório (exceto pequena área pálida externa e comissura corial que são pálidas) e metade apical do cúneo pretos; membrana fusca, porção apical mais pálida.

Lado inferior preto (metapleura com pruinosiidade prateada), coxas e pernas pálidas, mancha mediana e subapical dos fêmeas negras.

Corpo revestido de pêlos semierectos, antena II levemente engrossada para a extremidade apical, rostró alcançando as coxas III, disco do pronoto rugoso.